

Zur
etiologie und Therapie der Epididymitis.

~~~~~  
**Inaugural-Dissertation,**

welche mit Genehmigung der

medizinischen Facultät der Universität Breslau

zur Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin und Chirurgie

Mittwoch, den 23. Juni, Nachmittags 4 Uhr

in der Aula Leopoldina

nebst den beigefügten Thesen öffentlich verteidigen wird

**Reinhold Kreckler,**

praktischer Arzt.

~~~~~  
Opponenten:

Wilhelm Riesenfeld, prakt. Arzt.

August Winkler, Cand. med.



Breslau,

Druck von Robert Nischkowsky.

1886.

Seinem hochverehrten Lehrer

Herrn

Professor Dr. Neisser

in Hochachtung und Dankbarkeit

sowie

Seiner lieben Mutter

in kindlicher Liebe und Verehrung

gewidmet

vom

Verfasser.

Referent:

Herr Geh. Medicinal-Rath Prof. Dr. **Biermer.**

Die Epididymitis acuta in ihrem Zusammenhang mit der Gonorrhoe ist eine der häufigsten acuten Organerkrankungen, welche dem praktischen Arzt namentlich in den Grossstädten, in denen die Prostitution blüht, zu Gesicht kommen. Trotzdem ist sie in ihren Beziehungen noch nicht genügend studiert, um in ihrer pathologischen Bedeutung richtig verstanden und gewürdigt werden zu können. Sowohl der Pathogenese als namentlich der pathologischen Anatomie der Krankheit selbst und ihrer Folgezustände und dem Einfluss derselben auf die physiologische Thätigkeit des Hodens ist bei der Seltenheit und Schwierigkeit der bezüglichen Untersuchungen bisher nur vereinzelt Interesse gewendet worden, und in der Beantwortung einiger wichtiger Fragen fehlt es noch jetzt an der wünschenswerten Klarheit; jedenfalls wird die Epididymitis im allgemeinen noch als eine viel geringfügigere Krankheit angesehen, als sie in Wirklichkeit ist. In der vorliegenden Arbeit soll auf die eben bezeichneten Punkte mit Hülfe des litterarischen Materials und der neueren Untersuchungen aus der Breslauer königlichen Klinik genauer eingegangen, und die darauf begründete Theorie einer rationellen Behandlung von Gonorrhoe und Epididymitis an den klinischen Erfahrungen geprüft werden.

Die Angaben, die Epididymitis als Folgekrankheit der Gonorrhoe in der Häufigkeit ihres Auftretens betreffend, gehen ziemlich weit auseinander. Hasselt, Bergh, Engelstedt¹⁾ finden in sämtlicher Gonorrhoeen Epididymitis. Im Wiedener Krankenhaus²⁾ wurden von 1875—1883 beobachtet:

1541 Gonorrhoeen, davon 433 Epididymitis, 299 andere Complicationen; im k. k. allgemeinen Krankenhaus³⁾ in Wien in

12 Jahren in der ersten Abteilung für vener. Krankheiten 44 Gonorrhoeen, 1279 Epididymitis bei 670 andern Complicationen der zweiten Abteilung 3734 Gonorrh., 1409 Epididymitis, andere Complicationen.

Petersen⁴⁾ beobachtete im Petersburger Hospital 975 Gonorrhoeen, 386 Epididymitis, 151 andere Complicationen;

Magnien⁵⁾ bei 2425 Gonorrhoeen 678 Epididymitis.

Nach allen diesen Berichten kommen also auf 3 Gonorrhoeen 1 Epididymitis. Doch stammen diese Berichte aus Kliniken, wo stets verhältnismässig viel mehr Epididymitis-Fälle aufgenommen werden, als die viel leichter verlaufende Gonorrhoe auch finden in den Kliniken meist Patienten der ärmeren, körperlich arbeitenden Klasse Aufnahme, bei denen sich überhaupt öfter Epididymitis einstellt als bei den begüterten Gonorrhoe-Kranken, die sich körperlich schonen dürfen und sorgfältig behandeln. Dazu kommt noch, dass namentlich bei der indolenten ärmeren Bevölkerung sehr viele Gonorrhoeen gar nicht zur Kenntnis des Arztes gelangen, wohl aber alle Epididymitis-Erkrankungen. Dadurch erklären sich die erheblichen Schwankungen der statistischen Angaben; denn Tarnowski⁵⁾ in Petersburg beobachtete unter 5203 Gonorrhoeen 637 Epididymitis, also etwa $\frac{1}{8}$; und nach Berghs⁶⁾ Erfahrungen aus seiner Privatpraxis stellt sich das Verhältniss noch günstiger; er findet 7,3% der Gonorrhoe Epididymitis. Aus der hiesigen Klinik stammt folgende Tabelle:

Gonorrhoe allein.					Gonorrhoe und Epididymitis.				
Jahr.	Klin. Abteil.	Poliklinik.	Städt. Abteil.	Sa.	Klin. Abteil.	Poliklinik.	Städt. Abteil.	Sa.	Gesamt Summe
1877	15	—	—	15	5	—	—	5	20
1878	52	105	—	157	18	25	—	43	200
1879	37	222	65	324	11	35	12	58	383
1880	40	196	66	302	13	39	24	76	377
1881	55	269	90	414	24	36	26	86	500
1882	40	291	96	427	15	48	39	102	522
1883	59	260	77	396	22	49	35	106	509
1884	62	268	60	390	15	50	25	90	488
1885	50	213	54	317	14	40	28	82	399
Summa	410	1824	508	2742	137	322	189	648	3390

Nach derselben erkrankt ungefähr der fünfte Teil der Tripperkranken an Epididymitis.

Eine Statistik aus Militärlazarethen zu erreichen war leider nicht möglich. Dieselbe würde in jeder Hinsicht die besten Resultate geben, da hier Menschen gleichen Alters unter ganz gleichen Lebensbedingungen stehen und keine Gonorrhoe oder Epididymitis unbeobachtet bleiben kann.

Die Pathogenese der Epididymitis wurde in sehr verschiedener Weise zu erklären gesucht, zuweilen durch Theorien, welche den ganzen Vorgang in mystisches Dunkel hüllten. Féréol⁷⁾ stellte eine besondere blenorragische Diathese auf mit sekundären Erscheinungen, ähnlich der Syphilis. Organische Sympathie nach Rollet⁷⁾, Reflexaction nach Fournier¹⁾, pyämische Infection durch allmähliche Absorption des Eiters von der Oberfläche der entzündeten Schleimhaut und daraus folgende Blutvergiftung, das waren Erklärungsversuche, die nichts weniger als Licht in den Zusammenhang zwischen Gonorrhoe und Epididymitis brachten.

In neuerer Zeit hat Diday⁸⁾ die Epididymitis als eine rheumatische Affection aufgefasst, wie er alle Complicationen der Gonorrhoe als auf rheumatischer Diathese sich entwickelnd zu erklären versuchte. Obwohl er die Gonorrhoe als infectiöse, durch den Gonococcus hervorgerufene Krankheit anerkennt, spricht er doch dem Bacterium jede Rolle bei den secundären Erkrankungen ab; Horteloup und Jullien schliessen sich ihm an. Abgesehen davon, dass diese „rheumatische Diathese“ auch nur eine sehr unbestimmte Vorstellung ist, die nicht genügen kann als Grundlage für ein so wohl charakterisiertes, abgeschlossenes Bild acuter Entzündung, wie es die Epididymitis bietet, sind dieser Unklarheit entsprechend auch seine Gründe zum Teil direkt der Wahrheit widersprechend, zum Teil wenigstens sehr unklar und haltlos. 1. „Die Complication tritt nicht vor dem 22. Lebensjahr auf.“ Warum sollte dieses für rheumatische Diathese sprechen, da wir doch sehr oft Rheumatismus vor diesem Alter auftreten sehen? Ausserdem ist es nicht richtig, unter 103 Patienten der hiesigen Klinik sind 37 jünger als 22 Jahr, der eine sogar erst 16 Jahr. Kann man überhaupt den Zeitpunkt irgend einer krankhaften Disposition so scharf abgrenzen? 2. „Epididymitis recidiviert bei jedem neuen Tripper“; ist ebensowenig

beweisend, denn dieser Umstand könnte auch auf bestimmte localer, nicht allgemeiner Disposition beruhen, wie wir später sehen werden. Auch kann man die einmal erkrankt gewesene Epididymis als *locus minoris resistentiae* ansehen. Es tritt aber Recidiv bei neuer Gonorrhoe zwar öfter, aber durchaus nicht immer ein. 3. „Es giebt keine Prophylaxe.“ In Folgendem soll untersucht werden, inwieweit eine prophylactische Behandlung für Epididymitis anzustreben und zu erreichen ist. Wie weit die andern Gründe, 4. „dieselben Complicationen treten zuweilen bei Brüdern auf“, 5. „die vom Tripper abhängigen Erkrankungen kommen nicht nur zusammen oder alternierend vor, sondern sie zeigen auch einen derartigen Wechsel von Besserung und Verschlimmerung, wie er dem acuten Gelenkrheumatismus eigen ist“, 6. „Jede dieser Störungen unterscheidet sich durch einige Merkmale von der gleichnamigen, durch Gonorrhoe hervorgerufenen Störung“ — durch die klinische Beobachtung gestützt sind, ist sehr unbestimmt; man kann auch nicht absehen, wieso sie den Beweis der rheumatischen Natur liefern sollten. Dasselbe gilt von dem letzten, 7. Grunde: „Mit dem Auftreten der Complication vermindert sich der Ausfluss“, der ausserdem ebenfalls nicht immer zutrifft. In vielen Fällen tritt, vielleicht unter dem Einfluss des hohen Fiebers, wohl Verminderung ein, aber durchaus nicht immer; zuweilen vermehrt sich der Ausfluss sogar erheblich oder erscheint wieder, wenn er vorher geschwunden war.

In dieser Theorie Diday's ist besonders der Einfluss auf die Therapie gefährlich, da sie die Möglichkeit einer wirksamen localen Prophylaxe ausschliesst, also auch auf die vorbeugende Behandlung der Gonorrhoe und auf das Vermeiden traumatischer Gelegenheitsursachen keinen Wert legt. Diday verlangt, dass die Behandlung hauptsächlich eine antirheumatische sei und in Bädern und Wechsel des Klima neben localer Behandlung der Epididymitis bestehe. Després⁹⁾ hat die Ansicht ausgesprochen, dass *retentio spermatis* Ursache der Entzündung sei: Hoden und Nebenhoden füllen sich an, und das geringste Trauma, Erkältung, Ermüdung, Pollution, Coitus reiche hin, die Entzündung zu entflammen. Die Epididymitis wäre demnach rein mechanischen Ursprungs, kann ausser der Gonorrhoe auch durch Urethralsteine oder durch Tumoren, welche die *Ductus ejaculatorii* verstopfen, hervorgerufen werden. Dem würde entgegengehalten

ass der Hoden bald aufhöre Sperma zu producieren, wenn dies nicht abgeführt werde. Auch müsste Epididymitis dann gerade bei enthaltsamen Leuten, alten Menschen und Reconvalescenten aus schweren Krankheiten, viel häufiger sein als bei Gonorrhoe, wo doch häufig genug Pollutionen eintreten und für Abführung des Sperma sorgen. Wodurch sollte eine so häufige und intensive Stauung bei Gonorrhoe herbeigeführt werden? Endlich kann nach den neueren Anschauungen von der Natur der Entzündungserreger eine Entzündung vom Charakter der acuten Epididymitis nicht durch blosse mechanische Stauung, bei der alle bakteriellen Körper fehlen sollten, hervorgebracht werden.

Schon Ricord⁹⁾, Guellierier¹⁰⁾, Besnier⁷⁾ sahen die Epididymitis als eine direkte Fortsetzung der Urethritis längs des Vas deferens und Funiculus spermaticus an. In neuerer Zeit ist wieder Terrillon¹¹⁾ für diese naheliegende Ätiologie der Nebenhodenentzündung eingetreten und hat durch experimentelle Untersuchungen an Hunden die Entwicklung der Entzündung vom Vas deferens aus klar zu legen gesucht.

Mit der Entdeckung des Gonococcus im Jahre 1879 durch Neisser war das lebende Virus der Gonorrhoe und aller Wahrscheinlichkeit nach auch der Epididymitis gefunden. Es sei gestattet, etwas näher auf das Bacterium und seine Beziehungen zur Urethritis einzugehen. Der Gonococcus besteht aus Diplococcen von ungefähr 1,25 μ Grösse; die beiden Hälften, durch einen Spalt getrennt, bilden Semmelform; die Hälften sind an den einander zugekehrten Seiten etwas abgeplattet und zeigen oft hier auch eine geringe Einziehung als Zeichen beginnender neuer Teilung. Charakteristisch ist, dass die zweite Teilung immer in einer Ebene senkrecht zu derjenigen der ersten erfolgt, so dass die Coccen nicht in Ketten geordnet sind, sondern stets Haufen bilden, in denen sie fast stets zu zwei und zwei zusammenliegen. Diese Haufenbildung ist das beste Unterscheidungsmerkmal gegenüber andern Micrococcen. Der Gonococcus wird mit basischen Anilinfarben, am besten mit Methylviolett, Dahlia, Gentianviolett in verdünnten Lösungen bei kurzer, und mit Methylenblau bei längerer Einwirkung des Farbstoffes gefärbt. Die Farbe wird immer schwach festgehalten, durch Alkohol, verdünnte Essigsäure oder Salzsäure werden die Coccen schnell entfärbt. Für die Praxis am geeignetsten ist Fuchsin in concen-

trierter wässriger Lösung; es wirkt schnell ein und überfärbt nicht. Das Sekret wird dünn aufgestrichen, über der Flamme getrocknet, $\frac{1}{2}$ bis 1 Minute der Farblösung ausgesetzt, dann wieder über der Flamme getrocknet und ohne Deckglas im Öl des Immersionslinse betrachtet.

Diese Coccen findet man nach Bumm¹²⁾ hauptsächlich in Gruppen geordnet im Protoplasma der Eiterzellen, nie im Kern. Es wird angenommen, dass die Coccen activ in die Eiterkörperchen eindringen, nicht passiv von diesen umschlossen werden, und sich dann in ihnen vermehren. Die Eiterzellen sind zuweilen so stark gefüllt, dass sie wie gebläht erscheinen; schliesslich bersten sie und die Coccen erscheinen locker um den Kern gelagert, zerstreuen sich allmählich und man findet sie einzeln frei im Sekret. Im Anfangsstadium, wenn die Absonderung der Gonorrhoe noch mehr serös ist, findet man zahlreiche Coccen auf den Epithelien im förmlichen Rasen sitzend, weniger in Eiterzellen. Im Stadium der starken eitrigen Absonderung sind coccengefüllte Eiterzellen zahlreich; im chronischen Verlauf enthält das Sekret oft noch zahlreiche Coccen, wenn es auch nur noch in Spuren abgesondert wird. Je schwieriger der Abfluss des catarrhalischen Sekrets ist, um so länger haften die Coccen; sie sind im Sekret der chronischen Gonorrhoe noch nach Jahren von verschiedenen Untersuchern nachgewiesen worden. Die Coccen werden in ihrer Entwicklung von der Therapie sehr beeinflusst; Leistikon¹²⁾ machte eingehendere Untersuchungen und fand, dass besonders Sublimat schon in Verdünnung von 1 : 10000, dann auch Tannin, Bleiessig, Höllenstein, Carbolsäure die Entwicklung der Coccen beschränken. Dieselben werden sehr gering an Zahl, treten aber wieder zahlreich auf, wenn die Anwendung des Mittels nicht längere Zeit fortgesetzt wird.

Dass der Gonococcus der Entzündungserreger der Gonorrhoe sei, daran kann nach den klinischen und experimentellen Untersuchungen kein Zweifel mehr bestehen. Er ist nicht allein in allen Fällen gonorrhöischer Urethritis, wo öfter und genau untersucht worden ist, sondern auch bei den secundären Entzündungen nachgewiesen worden in der Blase, in periurethralen Abscessen, in der Conjunctiva, im Kniegelenk bei Rheumatismus gonorrhöicus, bei allen gonorrhöischen Erkrankungen des weiblichen Genitaltractus und im Rectum bei gonorrhöischer Entzündung der Mast-

Harnschleimhaut. Ausserdem ist der spezifische Charakter des Gonococcus durch gelungene Impfversuche bewiesen, wie sie von Lockhardt aus einer Reinkultur in der vierten Generation in die Urethra eines Mannes, und von Bumm ebenfalls aus einer Reinkultur in die weibliche Harnröhre ausgeführt wurden. Beide waren von einer charakteristischen heftigen Gonorrhoe gefolgt; der erste Patient, ein Paralytiker im letzten Stadium, starb am 10. Tage; im zweiten Fall bestand die Urethritis 6 Wochen trotz gleichiger Behandlung mit 1% Höllensteinlösung, im Sekret waren während der ganzen Dauer der Krankheit die Coccen nachweisbar.

Nach den Untersuchungen Bums entwickeln sich die Coccen sehr schnell und vermehren sich so, dass sie schon in 24 Stunden in grosser Zahl vorhanden sind. Sie sitzen auf der Oberfläche und zwischen den Epithelien, und schon am zweiten Tage der Erkrankung kann die ganze Epitheldecke von Gonococcen durchsetzt sein; der Weg ist die intercelluläre Kittsubstanz. Die Epithelzellen werden durch die Pilze auseinandergesprengt und einzeln oder in grösseren Schollen abgelöst, so dass das Corpus papillare bloss liegen kann. Im subepithelialen Gewebe finden sie sich nur in den oberflächlichsten Bindegewebsschichten, nicht sehr reichlich und nur in kurzen Zügen. Die Heilung erfolgt dadurch, dass das Epithel aus den Resten proliferiert, den Verlust ersetzt und dem weiteren Vordringen der Gonococcen eine Schranke entgegensetzt, indem die äussersten Epithelzellen zu einer epidermisartigen Schicht zusammenwachsen. Der Beginn dieser Heilungs-tendenz zeigt sich schon am vierten Tage, am 10. ist der Process im vollsten Gange, und in der 3. Woche beendet. Das Epithel trägt vorläufig noch den Charakter des Pflasterepithels, bis die Schwellung und Wucherung des corpus papillare zurückgegangen ist. Die Lebens- und Fortpflanzungsfähigkeit der Coccen in den tieferen Gewebsschichten ist beschränkt, sie leisten dem Einfluss des Gewebes nur geringen Widerstand und verschwinden schnell aus den Lymphspalten der Mucosa. Das Sekret versiegt allmählich, den Coccen wird der Nährboden entzogen, sie verschwinden und es tritt Heilung ein. Diese Beobachtungen Bums sind an der Conjunctivalschleimhaut gemacht; unter andern Bedingungen wird der Process wohl etwas modificiert werden. Doch kann man wohl annehmen, dass die wichtigsten Eigentümlichkeiten des Gonococcus, nur im Cylinderepithel und in den oberfläch-

sten Bindegewebsschichten zu wuchern, auch bei der Urethra Schleimhaut zur Geltung kommen. Der anatomisch untersuchte Fall Bockhardts, der 10 Tage nach der Inoculation gestorben, Paralytiker, kann nicht ganz als massgebend gelten, da durch Injection einer sehr grossen Menge von Coccen bei einem fast moribunden, sehr decrepiden Individuum eine sehr intensive und progrediente Urethritis erzeugt worden war; schon nach 10 Tagen fanden sich Nierenabscesse, die nach Bockhardts Untersuchung Gonococcen enthielten, was Bumm bestätigt. Wenn sich der nach hier eine stärkere Beteiligung der tieferen Gewebsschichten bis in die Submucosa an der Cocceninvasion fand, so wird dies durch die geringe Widerstandsfähigkeit des von der aufreibenden Krankheit geschwächten Gewebes und durch die heftige Infection mit einer grossen Menge des Virus erklärt und kann nicht gleicher Weise für jeden gewöhnlichen Fall von Gonorrhoe angewendet werden. Die Beziehungen zwischen Epithel und Coccen waren ungefähr dieselben wie bei den Befunden Bums: Das Epithellager war gequollen und zerklüftet, allerdings aber an keiner Stelle vollkommen abgestossen; zwischen den Epithelzellen Coccen. Bockhardt fand trotz sorgfältigen Suchens keine besondere Ansammlung von Gonococcen in den Schleimhautfalten noch in den Lumina der Littreschen Drüsen.

Will man diese Beobachtungen zur Erklärung der Epididymitis herbeiziehen, so muss man annehmen, dass die Coccen sich nach den hinteren, tieferen Teilen der Harnröhre verbreiten und hier in die Ductus ejaculatorii eindringend längs des Vas deferens bis zur Epididymis gelangen und hier eine acute Entzündung erregen. Ob die Gonococcen hauptsächlich auf, oder ob sie mehr zwischen den Epithelien in der Harnröhre nach hinten dringen lässt sich nicht bestimmt sagen; jedenfalls aber ist das Wachstum derselben um so intensiver, je näher sie der Oberfläche liegen; diese werden es also auch wohl sein, welche sich am schnellsten in die tieferen Teile der Urethra vermehren und Epididymitis erregen. Diese Bewegung ist wohl theils actives Wachstum, theils passives Geschobenwerden, wie es die so häufige Gelegenheit zur Ursache des Trauma vermuten lässt. Beides mag auch im Vas deferens beteiligt sein, hier aber wohl das Wachstum innerhalb der obersten Epithelschichten die Hauptrolle spielen; denn eine bloss mechanische Bewegung nach hinten zur Epididymis sind die

physiologische Sekretstrom und der Apparat zu dessen Fortbewegung, die Musculatur des Vas deferens und die Flimmerzellen der Epididymis entgegen; auch lässt sich, wie wir später sehen werden, in den meisten Fällen eine Beteiligung des Vas deferens an der Entzündung nachweisen. Es sind aber auch genug mechanische Momente gegeben, welche eine Weiterbeförderung der Coccen in der Urethra und im Vas deferens unterstützen. Die Bewegungen, welche die in der Nähe liegende Blase bei Füllung und Entleerung macht und den Samengängen mitteilt, sowie die Beweglichkeit des frei herabhängenden Hoden und Penis, vielleicht auch die Anstrengungen der Bauchpresse, wobei die den Funiculus spermaticus umfassenden Fasern des m. transversus abdominis an diesem zerren, begünstigen die Ausbreitung des Virus. Der Weg ist anatomisch vorgezeichnet, und hiermit lässt sich auch erklären, warum Epididymitis eine so häufige Complication der Gonorrhoe ist: die Öffnungen der Ductus ejaculatorii sind die grössten aller in die Harnröhre mündenden secundären Drüsengänge, und sie liegen weit hinten zur Seite des Caput gallinaginis, wo die Gelegenheit zur Stauung des virulenten Sekrets in der engen Harnröhre besonders günstig ist. Die Gonorrhoe selbst ist so contagiös und meist so intensiv auftretend und hartnäckig wie kein anderer acuter Schleimhautcatarrh; es ist daher auch erklärlich, dass sie sich so vielfach compliciert wie keine andere catarrhalische Affektion. Vielleicht ist auch noch individuelle Disposition zu Epididymitis in besonderer Weite und Art der Mündung der Ductus ejaculatorii gegeben; diese würde dann für die wiederholten Recidive bei neuer Gonorrhoe eine Erklärung geben.

Wenn wir auch leider keine anatomische Untersuchung der Samengänge auf Gonococcen bei Epididymitis haben, so kann man doch das Fortschreiten der Entzündung von der Mündung der Ductus ejaculatorii aus bis zur Epididymis klinisch sowohl wie anatomisch verfolgen.

Für die Verbreitung bis zur Epididymis bedürfen die Gonococcen eine gewisse Zeit. Es stimmen auch alle Autoren darin überein, dass Epididymitis vor Ablauf der ersten Woche nach Auftreten der Gonorrhoe sehr selten sei. Nach Guellier¹⁰⁾ kommen von 239 Fällen 16 in der ersten Woche vor, die meisten, 136, in der 5.—6. Woche. Ähnliche Angaben machen Magnien⁶⁾,

Fournier¹³⁾; Jullien¹⁴⁾ findet die meisten Fälle in der 4. Woche. Dasselbe beobachteten Tarnowski⁵⁾ und Fürbringer¹⁾, welche die grösste Zahl der Epididymitis-Fälle in der 3.—4. Woche nach der Gonorrhoe auftreten sahen. Aus der Breslauer Klinik finden sich bestimmte Zeitangaben bei 206 Fällen.

Gegen Ende der	1. Woche	8.
Im Verlauf der	2.	= 26.
"	"	" 3. = 43.
"	"	" 4. = 33.
"	"	" 5. = 22.
"	"	" 6. = 16.
"	"	" 7.—12. = 29.
	Nach ½ Jahr	18.
	" 1	= 8.
	" 2	= 3.

Aus dieser Tabelle sieht man, dass zwar die meisten Fälle von Epididymitis in das acute Stadium der Gonorrhoe treffen, dass aber auch bei sehr chronischem Tripper, der sich über Jahre erstreckt, der Nebenhoden sich noch entzünden kann; diese Beobachtung wird von allen Autoren bestätigt.

Beteiligung der Prostata.

Ist der Gonococcus bis an den Colliculus seminalis nach hinten gewandert und in die Ductus ejaculatorii eingedrungen, so lässt sich annehmen, dass auch die Prostata öfter bei der Entzündung der Epididymis mit afficirt sein dürfte. Untersuchungen in dieser Richtung hat Neumann¹⁵⁾ in Wien angestellt. Die Prostata erkrankt gewöhnlich in der 3. Woche der Urethritis und ist sehr häufig mit Epididymitis verbunden, und meist auf der Seite der Epididymitis allein oder wenigstens am stärksten entzündet. In 17 Fällen von Prostatitis waren 15 mit Epididymitis complicirt; von diesen war neunmal der der Epididymitis gleichseitige Lappen der Prostata allein entzündet, in 3 Fällen die ganze Prostata, dreimal der der Epididymitis entgegengesetzte Lappen. Krampfartige Schmerzen, tenesmus vesicae et recti, Schmerzen beim Stuhl, Fieber, zuweilen glasiger, schleimig-zäher Ausfluss deuten auf eine tiefere Affektion hin, und die Untersuchung per anum ergibt Schwellung und Schmerzhaftigkeit der Prostata. Hier kommt es öfter zur Abscedierung, und dann kann die Prostatitis auch auf die Function der Hoden von unheilvollem Einfluss wer-

en, indem durch narbige Verziehungen die Ductus eiaculatorii abgelenkt, verengt oder ganz verschlossen werden können, wie auch Ultzmann¹⁾ und Andere mitgeteilt haben.

Natürlich braucht nicht bei jeder Epididymitis die Prostata mit beteiligt zu sein.

Spermatocystitis.

Wie oft Spermatocystitis im Verein mit Epididymitis und als Folgeerscheinung der Gonorrhoe auftritt, lässt sich nicht sagen, da nur selten diesen kleinen und tief verborgenen Organen Aufmerksamkeit und Untersuchung zu Teil wird. Aus anatomischen Gründen ist es durchaus nicht notwendig, dass die Vesiculae seminales immer an einer Entzündung des Vas deferens teilnehmen; die Vesicula ist eine erweiterte Wandkrypte des Vas deferens und setzt sich an die Wand desselben unter einem Winkel seitlich an; die Entzündung kann sich an der freien Wand des Vas deferens weiter fortsetzen, ohne die Vesiculae seminales zu berühren. Róna¹⁶⁾ beobachtete unter 46 Fällen von Epididymitis 12mal constatierbare Beteiligung der Samenbläschen, und zu späterer Zeit unter 36 Fällen 3mal Vesiculitis.

Die Symptome sind folgende: Es stellt sich ein dumpfer, tiefer im Becken verborgener, zuweilen gegen Lenden und Kreuzbein ausstrahlender Schmerz ein; auch die Defaecation und die Urinentleerung sind schmerzhaft. Erectionen treten häufig ein durch Reflex von den entzündlich gereizten Bläschen aus; andererseits können bei Beginn der Entzündung bei den leichtesten Reizen, bei geringfügigen Erregungen der Geschlechtsorgane Samenergüsse ohne Erection erfolgen. Die Samenflüssigkeit wird dünn, wässrig, die Spermatozoen sind spärlich, meist unbeweglich, einige zerfallen; sie verringern sich immer mehr. Eiterkörperchen sind mehr oder weniger zahlreich beigemischt, zuweilen so stark, dass das Sperma getrübt grau, selbst grünlich aussieht; der Eiter ist dem Sperma gleichmässig zugemischt, nicht in Flocken oder Streifen, wie es der Fall ist, wenn der Eiter aus der Urethra sich der Samenflüssigkeit beimengt. Das Sperma kann auch zahlreiche rote Blutkörper enthalten, so dass sein Aussehen rötlich wird in verschiedenen Nüancen bis zum rein blutigen Eiaculat, wie es vielfach als Haemospermie beschrieben wird; es ist ein wertvolles Symptom, wenn man Blutung aus der Urethra oder

Prostata ausschliessen kann, wenn das Blut stets nur bei Emissionen kommt.

Die objective Untersuchung der Vesiculae seminales durch den Finger vom Mastdarm aus ist wegen der Lage und dem geringen Umfang der Organe erschwert. Man fühlt sie am oberen Rande der Prostata als teigig weiche, unebene, wenigstens 1 Z. weit aus einander stehende Gebilde von der Grösse einer türkischen Bohne im normalen Zustande. Bei Entzündung sind sie leicht geschwellt, meist bis Haselnussgrösse, und bei Druck schmerzhaft; zuweilen entleeren sie bei Fingerdruck ihren Inhalt.

Die Diagnose ist schwierig, die Symptome meist vieldeutig, wenig charakteristisch und schwer zu finden. Auch bei manueller Untersuchung lässt sich nicht immer mit Sicherheit entscheiden, ob die Schwellung den Samenbläschen oder dem analen Teil des Vas deferens angehört. Doch kann man wohl zur Diagnose kommen, wenn man die klinischen Erscheinungen und namentlich das Verhalten des Sperma im Verein mit dem palpatorischen Befund genügend berücksichtigt.

Die Vesiculitis ist fast immer Folge der Gonorrhoe, aus andern Gründen tritt sie nur sehr selten auf. Die Epididymitis folgt meist sehr schnell und verdeckt die Symptome der Samenblasenentzündung. Doch kann die Nebenhodenentzündung auch längere Zeit oder dauernd ausbleiben. Róna erwähnt einen derartigen Fall isolierter Spermatocystitis, welcher diese Erkrankung sehr gut illustriert:

„Ein 24jähriger Pharmazeut litt seit 14 Tagen an hochgradiger Blennorrhoe. Dysurie; Defaecation normal. Nebenhoden, Samenstrang, Samenbläschen zeigten nichts abnormes. Nach 2 Tagen spricht er mit der Klage vor, er habe Nachts gefiebert und müsse alle 5—10 Minuten urinieren. Sekret, jedoch nicht wie gewöhnlich, sondern bei erigiertem Penis fingerhutvoll fliesst unter Wohlustgefühl auf einmal eine orangegelbe consistentere Masse hervor, die einmal sogar rötlich war. An der Wäsche sind mehr orangegelbe als gelblichgrüne Flecken sichtbar. Im Mastdarm verspürt Patient spannende Schmerzen und glaubt Stuhldreiz zu empfinden, doch tritt keine Defaecation ein.

Unmittelbar über der Prostata beiderseits eine haselnussgrosse, sehr glatte, gespannte, ein wenig teigig anzufühlende, sehr schmerzhafte, von der Medianlinie abstehende Geschwulst, die diffus in

die Nachbarschaft übergeht. Auf Druck entschlüpft sie dem Finger und löst schmerzhaften Harnreiz aus. Mit dem Sistieren des Schmerzes fühlt sich Patient sehr erleichtert, aus der Harnröhre ergiesst sich beträchtliches Sekret, rötlich gelb, gallertig, mit gelblich grünem Eiter gemischt. Um das Trippersekret fernzuhalten, liess Róna erst den Patienten urinieren. Microscopisch viel Eiterzellen, wenig rote Blutkörperchen und sehr viel meist unbewegliche Spermatozoen und deren Fragmente.

Trotz der Behandlung hielt die Dysurie noch 6 Tage an, Erectionen und Eiaculationen verringerten sich. Nach 8 Tagen erflachte sich die Geschwulst so, dass man entsprechend den Samenbläschen kaum etwas palpieren konnte. Noch einige Wochen hielt das eitrig-spermatoide Sekret an und verschwand dann mit dem Tripper; Epididymitis trat nicht ein.“

Róna berichtet noch einen Fall, wo sich Epididymitis erst 2 Tage nach der Vesiculitis einstellte. Neumann¹⁵⁾ erzählt drei Fälle von genau beobachteter Samenblasenentzündung. Von anderen Autoren erwähnt Rapin¹⁷⁾ 4 Fälle, Verneuil¹⁸⁾ 2 Fälle.

Angaben über die Anatomie der Vesiculitis machen Godard¹⁹⁾, Marie²⁰⁾, Gaussail²¹⁾ Mitteilung. Die Entzündung zeigt sich in Verdickung und erhöhter Resistenz der Wandungen, Erweiterung der Buchten, Injection und Infiltration; der Inhalt ist zuweilen stark eingedickt, besteht aus Eiterzellen, roten Blutkörperchen, Epithelzellen. In alten Fällen sind die Wände atrophisch, sehr dünn, zuweilen durch dünnflüssigen massenhaften Inhalt sehr stark ectatisch. Im Allgemeinen bieten die Samenbläschen das Bild eitrigen Catarrhes.

Die Ausgänge der Vesiculitis können verschieden sein. Zunächst kann die Krankheit eine einfach catarrhalische bleiben und mit dem Heilen der Epididymitis nach einigen Wochen ebenfalls verschwinden. Doch kann sich ein chronischer Catarrh entwickeln, wie Auspitz²²⁾ beobachtete, wo sich nach geheilter Epididymitis Spermatorrhoe mit blutigem Sperma einstellte. Im Sperma finden sich deutlich Samentierchen, es wurde unter ziehenden Schmerzen im Samenstrang und Hoden entleert. Es kann auch zu Abscessbildung kommen mit mancherlei Gefahren: Im Jahresbericht des k. k. Wiener allgemeinen Krankenhauses“ wird 1884 ein Fall von sicher diagnostizierter Spermatozystitis erzählt, wo plötzliche Besserung eintrat, während im Harn reichlich

Eitermengen und Samenfäden erschienen: Der Abscess war in die Blase durchgebrochen. Péter²³⁾ sah einen andern Ausgang. Ein Mann mit gonorrhöischer Epididymitis starb kurz nach Aufnahme ins Hospital an Epididymitis. Bei der Sektion ergab sich Peritonitis mit seropurulentem Erguss. Die linke Vesicula seminalis enthielt Eiter- und Epithelzellen; ihr umgebendes Gewebe ist verdickt und injiciert; das darüberliegende Peritoneum ebenfalls entzündet. Hier war also eine Infection des Peritoneum von der entzündeten Sammelblase aus erfolgt. Einen ähnlichen Fall einer Peritonitis durch Abscess der Vesicula seminalis berichtet Velpeau¹⁵⁾. Petersen⁴⁾ sah bei einer Sektion, wo 8 Wochen nach der gonorrhöischen Infection der Patient durch Bruch der Wirbelsäure starb, hinter der Blase etwas links einen gänzlich grossen Tumor mit Resten von Schläuchen der Samenblase. Kocher²⁴⁾ sah ein anatomisches Präparat, wo die Samenblase gegen 50 Gramm Eiter enthielt. Auch Hardy¹¹⁾ hatte ähnliche Befunde.

Dr. Englisch²⁵⁾ erwähnt Entwicklung von Cysten an der hintern Blasenwand durch Adhäsionen, welche einige Ausbuchtungen einer Samenblase oder diese selbst abschliessen, als Folgeerscheinung von Entzündung. Er selbst besitzt mehrere derartige Präparate und sah auch bei Dittel solche.

Es können sich auch Samensteine aus kohlensaurem und phosphorsaurem Kalk bilden, wie Beckmann und Nencky²⁶⁾ solche fanden.

Entzündung des Vas deferens und Funiculus spermaticus

Wenn eine Beteiligung der Vesiculae seminales bei Epididymitis nicht immer eintreten braucht, so muss doch immer das Vas deferens als die Bahn, welche der Gonococcus verfolgt, miterkrankt sein, wenn auch vielleicht nicht immer klinisch nachweisbar. Alle Beobachter stimmen darin überein, dass das Vas deferens und der Funiculus sehr häufig bei der Epididymitis in mehr oder minder bedeutendem Grade mit afficiert sei; in den Häufigkeitsangaben weichen sie sehr weit aus einander, was wohl davon abhängt, dass leichte Fälle mit geringen Erscheinungen von den Einen als Funiculitis mitgezählt werden, von Andern nicht; einige Autoren untersuchen stets noch besonders die Beteiligung des Samenstranges bei jeder Epididymitis. Curling²⁴⁾ fand bei 104 Fällen

3mal Deferentitis, Hutchinson²⁴⁾ fand stets vor Epididymitis das Vas deferens verdickt. Bergh²⁷⁾ constatirte unter 120 Fällen 1mal Beteiligung des Samenstranges, in einer andern Berechnung bei 226 Fällen 98mal. Róna¹⁶⁾ fand unter 46 Epididymitis 2mal Affektion des Vas deferens; den intrapelvinen Teil fand Neumann¹⁵⁾ unter 100 Fällen 16mal mitgeriffen. In der hiesigen Klinik wird unter 103 Fällen 22mal Funiculitis erwähnt. Weissl betont im Jahresbericht des k. k. allgemeinen Krankenhauses in Wien jedesmal, dass Funiculitis und Deferentitis von wechselnder Intensität fast jedesmal bei Epididymitis nachzuweisen sei; Tarnowski⁵⁾ findet, dass nur in verhältnismässig seltenen Fällen Schmerzhaftigkeit und Schwellung des Vas deferens ausbleibt; auch Kocher²⁴⁾ findet sehr häufig Beteiligung des funiculus. Der Grund, warum sich das Vas deferens nicht immer beteiligt zeigt, liegt wohl darin, dass die Entzündung meist catarrhalisch, hauptsächlich auf die Schleimhaut des Kanals beschränkt ist und gewöhnlich nicht in die Tiefe vordringt. Daher sind Schwellung und Schmerz oft sehr geringfügig und verschwinden gegenüber den von der Epididymitis veranlassten Beschwerden. Das Verhältnis des Vas deferens zum Hoden wie das eines Lymphgefässes zu seiner Lymphdrüse aufzufassen und demgemäss eine Epididymitis wie eine Lymphadenitis, mit der Lymphangoitis verbunden sein kann oder nicht, wie es Trélat⁹⁾ that, geht nicht an. Hier ist kein dauernder Sekretstrom vorhanden, in welchem die Entzündungserreger direkt zur Epididymis hingeschwemmt werden könnten; und das Sekret entleert sich ausserdem grade in einer dem Gange der Entzündung entgegengesetzten Richtung. Man muss annehmen, dass die Gonococcen im Lumen oder Epithel des Vas deferens sich nach hinten verbreiten. Dieses ist ein einzelnes Rohr, von seinen Hüllen locker umgeben, und eine geringe Schwellung desselben wird sich deshalb hier viel weniger geltend machen, als eine Anschwellung in der Epididymis, wo zahlreiche und geschlängelte Gänge von einem dichten interstitiellen Gewebe zusammengefasst sind.

Unter den Symptomen der Funiculitis tritt neben den gewöhnlichen localen Erscheinungen der Entzündung oft eine besondere Reizung des Peritoneum in den Vordergrund, wenn der intrapelvine, direkt von Peritoneum bedeckte Teil des Vas deferens stärker afficirt ist. Die Schmerzen sind schon spontan sehr heftig weil,

das geschwellte Vas deferens mit seinen Hüllen in dem enghen Leistenkanal gepresst wird. Das Vas deferens lässt sich entweder deutlich herausfühlen und löst zuweilen schon bei geringem Druck shockartige Ohnmachtsanfälle aus; oder die Hüllen beteiligen sich intensiv an der Entzündung, es entsteht neben der Deferentitis eine Funiculitis mit Hydrocele acuta funiculi spermatici, und die Ganze bildet einen daumendicken, harten, knotigen Strang, sehr empfindlich ist. Er erstreckt sich bis in den Canalis inguinalis. Die Entzündung des analen Theiles des Vas deferens lässt sich durch Palpation vom Mastdarm aus ermitteln; er ist rabenknödelartig bis daumendick geschwollen.

Die Entzündung des Funiculus spermaticus verläuft meist leichter als die nebenhergehende Epididymitis. Aber zuweilen überdauern die Funiculitis jene um längere Zeit; Schmerzhaftigkeit und Schwellung halten öfter wochenlang an und sind auch der Behandlung der Epididymitis durch Compression und Suspensorium sehr hinderlich. Der intrapelvine Teil des Vas deferens pflegt nicht lange krank zu sein. Hier tritt nach den wiederholten Untersuchungen Neumanns¹⁵⁾ die Entzündung in 3 Tagen bis 3 Wochen, durchschnittlich in 8 Tagen, zurück. Als Residuum der Funiculitis bleiben öfter umfangreichere oder circumscripte knotige Verdickungen und Narbenbildungen zurück, die öfter auch schmerzhaft bleiben.

Ist Entzündung des Samenstranges neben Epididymitis sehr häufig, so kommen in sehr seltenen Fällen auch isolierte Entzündungen vor, wo der ganze Process sich allein im Vas deferens und seinen Hüllen abspielt, ohne bis zur Epididymis zu gelangen oder der Nebenhoden wird erst längere Zeit später ergriffen. Dieses Ereignis, obwohl sehr selten, war schon Ricord²²⁾ bekannt. Bergh⁶⁾ teilt 2 Fälle von circumscripter Deferentitis des analen Theiles mit, einer 4, einer 3 Tage vor Ausbruch der Epididymitis. Ausserdem²⁷⁾ einen Fall isoliert gebliebener Entzündung des ganzen Vas deferens und seiner Hüllen, die in etwa 3 Wochen zur Heilung kam. Cohn²⁸⁾ berichtet über eine Entzündung des Funiculus spermaticus in der rechten Inguinalgegend, die sich über das obere Drittel des Samenstranges erstreckte und die unteren zwei Drittel, Epididymis und Hoden frei liess. Der Tumor verschwand in einiger Zeit und hinterliess einen harten Strang, der sich nach unten ins Vas deferens fortsetzte.

inen ähnlichen Fall teilt noch Gosselin¹⁵⁾ mit, und Neumann¹⁵⁾ zwei. In einem dieser beiden Fälle handelte es sich um eine Entzündung des im rechten Leistenkanal gelegenen Teiles, die andern Abschnitte des Vas deferens waren gesund. Es kam im Verlauf von 5 Wochen zur Abscessbildung; unter den Bauchdecken bis zum äusseren Leistenring dehnte sich die Höhle. Nach der erfolgten Heilung war das Vas deferens zwar nicht vergrössert, aber derb, und zeigte perlschnurartige Verdickungen. Ausserdem wird in der Wiener med. Presse²⁹⁾ ein besonders charakteristischer Fall berichtet, der genauer mitgeteilt zu werden verdient:

„Der Patient, 46 Jahr alt, hat seit 3 Monaten Gonorrhoe. Während eines Hustenanfalls bemerkte er in der rechten Seite des Scrotum einen heftigen Schmerz, der zunahm und von Erbrechen und Fieber begleitet war. Der Leib ist balloniert; in der rechten Inguinalgegend findet man einen cylindrischen Tumor, am äusseren Leistenring beginnend und sich ins Scrotum verlaufend; Testikel und Epididymis sind gesund, das Vas deferens, welches in den Tumor direkt übergeht, ist schmerzhaft. Die Haut ist normal gefärbt, aber sehr warm, haftet am unterliegenden Gewebe, ist auch sehr empfindlich. Der Tumor ist 6 Cm. lang, 2 Cm. breit, hart und schmerzhaft spontan so wie beim Husten; es besteht das Gefühl eines unerträglichen Druckes. Der Puls ist sehr frequent, die Temperatur erhöht, Durst; vollkommene Appetitlosigkeit und grosse Prostration. Der Kranke erbrach und war seit mehreren Tagen obstipiert, hatte am Abend seines Eintritts, 15. März, Schlucken. Es kam die Frage in Erwägung, ob man es mit einer Hernia incarcerata zu thun habe. Eis, 20 Blutegel. 16. März: Schlucken und Erbrechen geschwunden; es erfolgt durch ein Drasticum reichlicher Stuhl, damit war die Diagnose Funiculitis klar. Es blieb ein harter Strang übrig, der in den Samenkanal überging. Am 30. März verliess der Patient das Hospital.“

Auch Boyer²⁴⁾ und Ricord²⁴⁾ sahen isolierte Funiculitis unter peritonealen Erscheinungen.

Anatomisch untersucht ist das entzündete Vas deferens von mehreren Autoren. Gaussail²¹⁾ fand „die Canales deferentes hypertrophisch, ihre Wand vascularisiert. Der linke Kanal geschwollen bis zur hinteren Öffnung des Canalis inguinalis, der rechte in seiner ganzen Ausdehnung; die Wände sind verdickt,

die Oberfläche rot, das Lumen vermindert.“ Er hat 2 Fälle untersucht. Hardy¹¹⁾ schildert folgendes: „Der Canalis deferens adhärirt den Elementen des Samenstranges und hat das doppelte Volumen wie auf der gesunden Seite, ist auch härter. Die Wände haben ein weissliches, speckiges Aussehen, ohne Spur von Vascularisation.“ Marcé²⁰⁾ findet im Canalis deferens eine gelbliche Masse aus Eiterkörpern, Cylinderepithelien und granulierten Körperchen bestehend; Spermatozoen fehlten. Die Hüllen sind ebenfalls stark entzündet. Ebenso constatirte Schepelern²⁴⁾ in zwei Fällen eitrigen Catarrh des Vas deferens. Peter²³⁾ findet das Vas deferens und das umgebende Zellgewebe hart und injiciert, seine Schleimhaut blaue.

Dass die Entzündung aber nicht bloss eine catarrhalische ist, lehren die Fälle, wo starke narbige Indurationen zurückbleiben oder Abscessbildung entsteht. Rocher²⁴⁾ fand in einem Falle, dass sowohl das Vas deferens, hauptsächlich aber das umgebende Gewebe verdickt sei. Zuweilen kommt es zum vollkommenen Verschluss des Vas deferens, wie ihn Terrillon und Malassou bei Hunden experimentell erzeugt haben. Gosselin¹¹⁾ fand in einem Fall den Abschnitt im Hodensack und Leistenkanal einer Ausdehnung von 10 Cm. verschlossen, in einem andern war der Verschluss vollständig und reichte von der Epididymis bis zur Blase. Auch Delaporte¹¹⁾ hat Obliteration des Vas deferens gefunden. Wie oft dieses Ereignis eintritt, kann man nicht bestimmen, es gehört jedenfalls eine sehr intensive Entzündung mit tiefgreifender Zerstörung des Epithels dazu, diesen Ausgang herbeizuführen. Aber nicht bloss dieser Endausgang, sondern auch die narbigen Knotenbildungen und Verdickungen im Funiculus spermaticus dürften oft genug die Passage des Spermas immer hindern.

Epididymitis.

Die klinischen Erscheinungen der Nebenhodenentzündung sind wechselnd, in den verschiedenen Krankheitsfällen verschiedene. Zuweilen weist nur ein leichter, dumpfer Schmerz und eine geringfügige, auf Druck schmerzhaftes Schwellung des Nebenhodens auf die bestehende Entzündung hin, ohne dass sich Fieber oder sonstige Störungen des Allgemeinbefindens geltend machen. In einiger Zeit verschwinden diese Symptome wieder oder steigern sich zu voller Entzündung. Bei andern Patienten setzt d

Krankheit sehr acut ein, der Nebenhoden schwillt in kurzer Zeit enorm, bis zu Faustgrösse. Er fühlt sich bald gleichmässig hart an, bald treten besondere knotige Schwellungen in einzelnen Theilen der Epididymis hervor. Öfter lässt sich ein Erguss in die Tunica vaginalis constatieren, es entsteht eine acut entzündliche Hydrocele, die meist mit der Heilung der Epididymitis wieder verschwindet. Die Haut des Scrotum ist oedematös, heiss, geröthet, glatt gespannt. Die Schmerzen sind in derartigen, schweren Fällen sehr spontan, sehr heftig und hindern jede Bewegung, nehmen aber bei Druck bedeutend zu.

Meist findet sich auch anhaltender Schmerz in der Lenden-gegend, auch in solchen Fällen, wo der Samenstrang nicht nachweisbar mitergriffen ist; sowie ausstrahlende Schmerzen in Kreuz, Lenden, Unterleib, Oberschenkel; Leyden¹⁾ erklärt sie durch Fortleitung der Entzündung auf den sacralen Nervenplexus.

Das Fieber hält sich meist in mässigen Grenzen; es können aber auch acut sehr hohe Temperaturen, bis über 41 Grad, sich in seltenen Fällen zeigen, unter Schüttelfrost und von den entsprechenden Störungen des Allgemeinbefindens begleitet. Zuweilen treten ausgesprochene Erscheinungen peritonitischer Reizung auf, Stuhlverstopfung, Ballotement, starke Schmerzen im Unterleib, Erbrechen, schneller Puls und grosse Hinfälligkeit. Eine wirkliche Peritonitis ist sehr selten.

Der Process hält sich meist einige Tage auf der Höhe der Entzündung und geht dann allmählich wieder zurück; doch dauert es meist 3 bis 4 Wochen, ehe eine Heilung eintritt, und auch diese ist nicht immer derart, dass eine restitutio ad integrum eintrete; in den meisten Fällen bleiben Verdickungen und Druckempfindlichkeit noch sehr lange Zeit, selbst dauernd zurück. Aus der Breslauer Klinik wurden von 70 Patienten 23 nach meist 3 bis 4 wöchentlicher Behandlung entlassen; bei der Mehrzahl trat in dieser Zeit eine bedeutende Abnahme der Schwellung und Schmerzen allerdings ein, ohne dass beide aber ganz verschwanden. Zuweilen bleibt Hodenneuralgie zurück.

In seltenen Fällen sehr intensiver Entzündung, nach Zeissl³⁰⁾ etwa unter 300 bis 400 Fällen 1mal, kommt es zur Vereiterung. Die ganze Epididymis kann dadurch zerstört werden, der Eiter kann nach aussen durchbrechen unter Fistelbildung, oder Granulationen wuchern gewächsartig hervor: fungus benignus testis.

Es kann sich auch aus den Residuen einer Entzündung Hoden-tuberkulose entwickeln.

Stellt so die Epididymitis schon in ihrem acuten Verlauf eine sehr unangenehme Krankheit dar, die grosse körperliche Beschwerden verursacht und den Patienten für längere Zeit arbeitsunfähig macht, so wird sie noch ernster zu beurteilen sein, wenn man ihre Folgezustände und deren Einfluss auf die Funktion des Organes berücksichtigt.

In neuerer Zeit haben Malassez und Terrillon⁽¹⁾ Versuche angestellt, um in die pathologische Anatomie der Epididymitis Klarheit zu bringen; sie erzeugten durch Injection von Argentum nitricum- oder Ammoniaklösung in das Vas deferens bei Hunden eine Deferentitis und Funiculitis, die sich in etwa 4 Tagen zu ihrem Höhepunkt entwickelte und in klinischen Erscheinungen und Verlauf vollkommen der Epididymitis gonorrhoeica des Menschen gleich; auch darin, dass organische Residuen namentlich in der Cauda epididymidis zurückblieben. An diesen Experimenten ist die pathologische Anatomie der Epididymitis, namentlich auch die mikroskopische, studiert worden. Die Epididymis entzündet sich bei diesen Versuchen wahrscheinlich durch Fortleitung von dem verletzten Vas deferens aus, nicht durch direkte Ätzung, denn ihre Gänge waren voll Sperma, die Epithelien derselben verändert, aber nicht zerstört, obwohl sich die Entzündung bis zum Caput epididymidis erstreckt hatte; es ist nicht wahrscheinlich, dass die ätzenden Flüssigkeiten bis hierher kamen. Die Entzündung breitete sich sehr schnell aus, sodass am 3. oder 4. Tage die ganze Epididymis ergriffen war, und blieb etwa 2 Wochen auf dem Höhepunkt.

Im Vas deferens ist das Epithel vollkommen zerstört, selbst das subepitheliale Gewebe und die Musculatur da, wo die Ätzung stärker eingewirkt hat. Es entsteht starke Eiterung und mischt sich dem Sperma zu, welches der Kanal enthielt; sein Lumen ist vergrössert durch den Epithelverlust, und durch den reichlichen Inhalt ectatisch. Die Muscularis ist widerstandsfähiger als das periphere Bindegewebe des Samenstranges, welches sich mit Ödem und Anhäufung junger Embryonalzellen sehr stark beteiligt. Bei geringerem Reiz ist das Epithel zwar nicht normal, aber das Lumen durch eine oder mehrere Lagen junger unregelmässiger Zellen, wahrscheinlich neuer Epithelien bekleidet. Später, nach 1 bis

$\frac{1}{2}$ Monaten, ist das Lumen wieder kleiner, das Sperma verschwunden; zwischen Muscularis und Inhalt findet sich junges Bindegewebe, oft ohne die normalen elastischen Fasern, also ganz neu gebildet. In 2—3 Monaten ist statt des Kanals nur noch ein Bindegewebsstrang vorhanden, das Vas deferens hat ein transparentes Aussehen und ist dünner als normal.

Das Epithel der Epididymis an den am wenigsten afficierten Stellen im frischen Stadium der Entzündung hat seine Flimmern grösstenteils verloren. Im Wand- und Zwischengewebe findet man einzelne Lymphkörperchen. Der Inhalt besteht aus Sperma mit Eiterkörperchen vermischt. Diese Veränderungen nehmen um so mehr zu, je heftiger die Entzündung, die Epithelien werden zuletzt ganz formlos, platt, die Gänge sind erweitert und mit Eiter und Schleim gefüllt; Muskulatur und Zwischengewebe sind noch wenig ergriffen, das Ganze gleicht einem acuten Catarrh. Das Sekret stagniert, weil die ihrer Cilien beraubten Flimmerzellen dasselbe nicht mehr fortschaffen können.

1 bis $1\frac{1}{2}$ Monate später zeigen sich Veränderungen chronisch entzündlicher Natur mehr in der Tiefe, im intercanaliculären Gewebe. Man findet hier Herde von jungem, neugebildetem Gewebe. In 2 bis 3 Monaten sieht man unter dem Epithel fibröses, dichtes Gewebe, narbiger Natur, welches die Muskulatur der Gänge durchsetzt und zerstört; das Lumen der Gänge ist an einzelnen Stellen cystisch erweitert, an andern zu einem ganz engen Spalt ohne Epithelzellen zusammengezogen, der ganze Gang atrophisch. Im Zwischengewebe finden sich Herde von zerfallenden Lymphkörpern in fibrösen Massen, welche sich an die narbigen Tubenwände direkt anschliessen. Viele der jungen embryonalen Zellen sind stark pigmentiert durch aufgenommenen Detritus. Die beschriebenen narbigen Stellen entsprechen den harten Knoten, die man namentlich in der Cauda epididymidis findet. Alle Veränderungen finden sich in der ganzen Epididymis, aber am meisten ausgeprägt in der Cauda. In der Tunica vaginalis besteht ein Erguss, welcher alle Zeichen eines acut entzündlichen trägt: eine trübe Flüssigkeit mit Fibrinflocken und roten und weissen Blutkörperchen; ausserdem zarte, rote Pseudomembranen, welche anfangs wenig adhären sind, sich aber später zu wahren Adhäsionen organisiert haben.

Eine anatomische Untersuchung der Epididymitis beim Men-

schen aus der neueren Zeit, namentlich mit Rücksicht auf den microscopischen Befund, auf die Untersuchung nach Gonococcus besitzen wir nicht. Terrillon citiert einige Beobachtungen von Gaussail, Marcé, Peter, Godard, aus neuerer Zeit von Schepelern, die in den wesentlichen Punkten unter einander und mit seinen eigenen Untersuchungen übereinstimmen. Schepelern hat einen Fall 8 Tage, den andern 23 Tage nach Beginn der Erkrankung untersucht. Er findet Infiltration, Schwellung und fibröse Verdickung der Epididymis; ausserdem in einem Falle einen erbsengrossen Abscess in der Cauda epididymidis. Microscopisch ergab sich ein eitriger Catarrh und Infiltration der Wände des Vas deferens; am Eiterherd waren die Wandungen der Kanäle bis zur Unkenntlichkeit infiltriert und im ganzen umliegenden Gewebe Eiterzellen. Ebenso fand Gosselin²⁴⁾ 26 Tage nach Beginn der Entzündung eitrigen Catarrh und Infiltration der Wände des Nebenhodens, noch ohne intensivere Beteiligung des Zwischengewebes, wie auch Malassez und Terrillon bei ihren Experimenten in diesem Stadium constatierten. Über Veränderungen 10 Tage nach der Erkrankung berichtet Marcé: „Die Cauda epididymidis ist zu einer harten, gleichmässigen Masse von dem Volumen einer Bohne angeschwollen; dieselbe ist von derber Beschaffenheit, gleichmässig, von gelblicher Farbe, wenig vascularisiert. Die Hüllen sind um das 3 bis 4fache verdickt, ihre Hohlräume mit einer gelblichen Masse ausgefüllt; die Wände der Gänge sind verdickt, das intercanaliculäre Gewebe entzündet. In Corpus und Caput epididymidis finden sich ähnliche Erscheinungen, nur von geringerer Intensität. Auch die Tunica vaginalis bietet dasselbe Bild wie bei der künstlich erzeugten Epididymitis des Hundes: Erguss einer serosanguinolenten Flüssigkeit, Pseudomembranen besonders im Gebiet der stärksten Entzündung. Das Weiterschreiten des Entzündungsprocesses bis zur narbigen Einsehrumpfung lässt sich an den anatomischen Mitteilungen verfolgen. Peter schildert die Residuen einer alten, abgelaufenen Epididymitis folgendermassen: „Die Cauda bildet mit ihrer Tunica vaginalis einen haselnussgrossen Knoten. Auf dem Durchschnitt ist derselbe rötlich, fibrocellulär; die Windungen der Epididymis treten nur an wenigen Punkten hervor; aus ihrem Lumen lässt sich kein Eiter ausdrücken. Das fibröse Aussehen scheint durch eine Organisation des plastischen Ergusses

es in das interstitielle Gewebe hervorgerufen zu sein.“ Hardy findet dasselbe; auch die Tunica vaginalis ist sehr adhärent an die Cauda epididymidis, das intercanaliculäre Zellgewebe infiltriert und induriert. Die Wände der Gänge sind verdickt und sehen speckig aus. Auch Kocher findet in alten Fällen „bedeutende Schwellungen und Verdickungen, die unzweifelhaft vom interstitiellen Gewebe ausgehen.“ Der Hoden ist auch nach längerer Zeit wenig verändert. Er ist weich, etwas vergrössert, zuweilen die Canäle des Corpus Highmori etwas dilatiert. Nach längerer Dauer der Unthätigkeit atrophieren einige Tubae seminferae, sie bilden einen Spalt mit Zelltrümmern. Daneben findet sich aber noch immer viel functionsfähiges Hodengewebe, namentlich in den mehr peripheren Teilen des Testikels.

Soweit die anatomischen Mitteilungen. Klinisch erkennbar ist dieses Endresultat der Epididymitis an den derben, circumscripten, knotigen Verdickungen oder der allgemeinen geringen, aber harten Schwellung, wie sie nach der Entzündung zurückbleiben. Ausserdem ist in sehr vielen Fällen für lange Zeit eine geringe Schmerzhaftigkeit gegen Druck zu finden; in einigen seltenen Fällen bilden diese Indurationen den Ausgangspunkt für sehr quälende Hodenneuralgien. Bei den Patienten der Breslauer Klinik war in vielen Fällen nach 4—10 Wochen noch Schmerzhaftigkeit im Hoden vorhanden; bei 11 Patienten von 70 war nach derselben Zeit, in einem Falle noch nach 7 Monaten Knotenbildung oder allgemeine schmerzhaftige Anschwellung der Epididymis nachzuweisen. Berücksichtigt man diese anatomischen Störungen, zunächst im Samenstrang und Vas deferens, als deren wichtigste die Veränderungen in Epithel, Muskulatur und Umgebung, zuweilen mit vollkommenem Verschluss des Vas deferens hervorzuheben; ferner in der Epididymis, wo in den meisten Fällen das Epithel seiner zur Beförderung des Sekrets so wichtigen Flimmerzellen verlustig geht, wo ein Teil der Gänge atrophisch oder obliteriert, der andere cystisch erweitert ist; wo die Muscularis in derbes fibröses Gewebe umgewandelt und in das Narbengewebe der Umgebung eingeschmolzen ist: so lassen sich von vornherein schwere Störungen der Function erwarten. Die bedeutendsten Veränderungen haben meist in der Cauda epididymidis ihren Sitz, wo die Coni vasculosi sich schon zu dem Hauptgefäss vereinigt haben, welches sich als Vas deferens

fortsetzt; hier bleibt eine Funktionsstörung nicht mehr auf einzelne Teile des Hodens beschränkt, sondern trifft stets das ganze Organ. Eine Verengerung, Verzerrung, Abknickung oder gar Verschluss des Kanals durch den Zug des schrumpfenden Narbengewebes oder durch Obliteration kann das Lumen unwegsam machen. Ausserdem ist das Epithel ohne Flimmer und die Muscularis oft stark durch Narbengewebe durchsetzt, also können beide nicht mehr die Beförderung des Sperma besonders unterstützen. Man wird nach alledem erwarten, dass die Epididymitis nicht immer vorübergeht, ohne die Thätigkeit des Geschlechtsapparates bedeutend zu stören, und dass bei einer Epididymitis duplex immer Gefahr des Verlustes der Potentia generandi droht.

In vielen Fällen leichter Erkrankung, wo Schwellung und Schmerz gering sind und in einigen Wochen die Heilung vollständig und ohne Residuen eingetreten ist, mag die Entzündung nur catarrhalischer Natur sein und das Epithel sich vollständig ad integrum restituieren. Wenn aber die Krankheit das Parenchym schwerer ergreift, wenn Schwellung und Schmerzen sehr bedeutend waren und nur langsam und unvollständig weichen, so wird oft genug eine anhaltende Sterilität des ergriffenen Hodens die Folge der Epididymitis sein. Das bestätigen auch ältere und neuere Beobachtungen, und sie finden in den meisten Fällen Beziehungen zwischen der Induration und Sterilität. Liégeois¹⁹⁾ stellte mehrere Beobachtungen von Gosselin, Godard und eigene zusammen. Gosselin war der erste, welcher auf diesen Punkt aufmerksam machte; er hat 25 Fälle von Epididymitis duplex gesammelt, wo er das Sperma wiederholt untersuchte. In 20 derselben waren keine Spermatozoen nachzuweisen. Bei 13 von diesen ging die 2. Epididymitis auf einige Wochen bis mehrere Monate zurück, bei den 7 andern bestand die Epididymitis duplex schon seit Jahren. Fast alle hatten Indurationen in der Epididymis. In 2 Fällen von den 5, welche noch Samentierchen besaßen, hatten dieselben bei dem einen Patienten 8, bei dem andern 9 Monate nach der zweiten Epididymitis gefehlt und traten mit dem Verschwinden der Induration wieder auf. Auch zwei andere Fälle zeigten monatelang keine Samenkörperchen im Sperma, bis sie allmählich wiederkamen. Diese Fälle zeigen, dass der Hoden auch durch sehr lange Unter-

rechnung nicht seine Functionsfähigkeit verliert. Der 5. Fall hatte vor 20 Jahren Epididymitis duplex gehabt und besaß trotzdem Spermatozoen; er hatte nur auf einer Seite Induration.

Godard untersuchte 35 Patienten mit Epididymitis duplex ohne Spermatozoen. Er fand öfter, dass der Knoten schwand, aber nur in einem von diesen 35 Fällen traten mit dem Verschwinden des Knotens nach $1\frac{1}{2}$ jährigem Fehlen wieder Spermatozoen im Sperma auf. Martin, Langlebert, Fournier stimmen den Beobachtungen Godards im allgemeinen zu. Liégeois selbst verfügt über 28 Fälle. Unter diesen sind 14, bei denen die erste Epididymitis seit 45 bis wenigstens 1 Jahr besteht, die Zweite seit 10 Jahren bis meist 1 Jahr, nur in 3 Fällen erst seit $1-1\frac{1}{2}$ Monaten. Von diesen 14 hatten 4 Spermatozoen. Drei derselben hatten Induration beider Nebenhoden und zwei davon nur sehr wenig Samentierchen. In einem Fall war die Epididymis normal, und dieser zeigte viel Spermatozoen.

10 Fälle hatten keine Samenfäden. 14 andere Fälle waren ohne Erkrankung des zweiten Nebenhodens; von diesen besaßen 3 Spermatozoen, 2 sehr wenig, 1 in normaler Menge. 11 hatten keine Samentierchen. Von den 21 Fällen ohne Spermatozoen war in 15 Fällen beiderseitige Induration der Epididymis vorhanden, in 6 Fällen nur einseitige. Unter den 7 Fällen mit Spermatozoen war viermal wenigstens eine Seite frei; dreimal bestand doppelseitige Induration.

Stellen wir die Fälle dieser drei Beobachter zusammen, so haben wir bei

Gosselin	25	Ep. dupl.,	Sperma	bei	5
Godard	35	" " "	" " "	"	1
Liégeois	28	" " "	" " "	"	7

Summa 88 Epididymitis duplex, 13mal

mit Spermatozoen. Es ist also nach dieser Zusammenstellung nach doppelseitiger Nebenhodenentzündung nur in etwa $\frac{1}{7}$ der Fälle auf Wiedereintritt der Zeugungsfähigkeit zu hoffen. Terillon³¹⁾ führt ebenfalls 9 Fälle von Epididymitis duplex an, wo seit der zweiten Epididymitis schon 1 Monat bis einige Jahre verflossen waren und sich keine Samentierchen fanden bei wiederholter genauer Untersuchung. Er stellte fest, dass sich die Spermatozoen während einiger Tage nach der zweiten Entzün-

zung meist stark vermindern, um in der Mehrzahl der Fälle ganz zu verschwinden.

Eine anderweitige Beobachtung glaubte Liégeois und auch Andere gemacht zu haben: dass bei einseitiger Epididymitis die Zahl der Spermatozoen viel mehr als um die Hälfte verringert sei, was sich weder durch den Fortfall der Funktion des einen Hodens noch auch durch die Reduktion der Samenfäden bei den häufigen Pollutionen nach seiner Ansicht genügend erklären liess. Er fand diese merkwürdige Erscheinung nicht nur in 13 Fällen frisch behandelter, bei der Entlassung untersuchter Epididymitis sondern auch bei 3 Fällen von sehr alter einseitiger Epididymitis mit Induration. Terrillon erklärt die Erscheinung als Folge der Verdünnung des Sperma durch das entzündliche Sekret des Samenwege. Er hat sechs frische Fälle untersucht und nur in einem auffällig wenig Spermatozoen gefunden. Für die alten Fälle müsste man einen chronischen Catarrh der Samenwege der erkrankten Seite annehmen mit reichlichem Sekret, welches das Sperma der gesunden Seite noch stark verdünnt. Damit stimmt auch, dass bei diesen alten Fällen im Ejaculat weisse Blutkörperchen in grosser Zahl angetroffen wurden. Jedenfalls würde dieser Umstand, wenn er sich bestätigte, dazu beitragen auch bei nur einseitiger Epididymitis die Zeugungsfähigkeit des betroffenen Individuum noch mehr einzuschränken als es schon durch den Verschluss des einen Vas deferens geschehen würde.

Unter den deutschen Autoren hält Tarnowski die Gefahr der Sterilität für nicht sehr gross; Zeissl³²⁾ sagt sogar, die Funktionsfähigkeit wird niemals nachhaltig alteriert, ohne jedoch diese Behauptung durch Untersuchungsergebnisse zu stützen; auch berichtet er, dass in sehr vielen Fällen eine Induration zurückbleibe. Dagegen hat Kehrer¹⁾ gefunden, dass in 40 kinderlosen Ehen 14mal Azoospermie bestand, acht von diesen Männern hatten Epididymitis gonorrhoeica gehabt; von mehreren dieser Patienten wurde bestimmt behauptet, sie hätten nur einseitige Epididymitis gehabt. Dieses würde in Parallele zu bringen sein mit den vorher erwähnten Beobachtungen von Liégeois über das Sperma bei einfacher Epididymitis. Fürbringer bestätigt nach seinen eigenen Untersuchungen vollständig die Angaben Kehrer's. Auch Bergh³³⁾ hat fünfmal Azoospermie nach Epi-

epididymitis duplex gesehen. Prof. Neisser verfügt über 8 Fälle von Azoospermie nach Epididymitis duplex, von denen nur einer sich soweit veränderte, dass wieder Spermatozoen auftraten, wenn auch in geringer Zahl; vorher waren nur sehr selten einzelne verkrüppelte Samenfäden zu finden gewesen. Die Behandlung hatte unter anderem in Elektrizität bestanden. Als die Spermatozoen wieder erschienen, wurden die Ejaculationen schmerzhaft; es bestand demnach wahrscheinlich irgend ein mechanisches Hindernis für den Durchtritt der Spermatozoen.

Der Grund, warum derartige Angaben über Azoospermie als Folgeerscheinung der Epididymitis selten sind, liegt wohl meist darin, dass der Geschlechtstrieb und die Potentia coëundi vollkommen erhalten und das Ejaculat an Aussehen und Geruch dem normalen Sperma ganz ähnlich, höchstens vielleicht etwas dünnflüssiger ist, an Menge eher vermehrt als vermindert. Die Aufmerksamkeit wird also durchaus nicht auf diesen Gegenstand gerichtet.

Was die Häufigkeit der doppelseitigen Epididymitis anlangt, so weichen auch hierin die Tabellen sehr auseinander; so beobachteten Epididymitis, darunter doppelte:

Jullien	2160	165,	also ungefähr	$\frac{1}{12}$
Fournier	879	66	"	$\frac{1}{13}$
Guellerier	468	24	"	$\frac{1}{19}$
Im Wiener Krankenhaus	2700	97	"	$\frac{1}{28}$

In der Breslauer Klinik fanden sich unter 103 Epididymitis doppelseitige, also circa $\frac{1}{7}$. Ein Grund für diese bedeutenden Differenzen in den einzelnen Angaben lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen; er liegt vielleicht darin, dass einige Autoren die leichteren Fälle von Epididymitis mit geringen Symptomen nicht als solche mitzählen.

Wie viele Patienten mit doppelter Epididymitis ihre Zeugungsfähigkeit dauernd verlieren, kann man nach den bis jetzt vorliegenden Untersuchungen auch nicht einmal annähernd angeben; dass der Prozentsatz ein ziemlich hoher sei, lassen die Arbeiten von Liégeois und Terrillon vermuten. Man weiss aber noch weniger, wie weit eine einfache Epididymitis die Zeugungsfähigkeit beschränkt; dass eine Verminderung der Spermatozoen auch nur um die Hälfte nicht ganz gleichgültig ist, liegt auf der Hand; nach Liégeois scheinen aber noch andere besondere Momente ungünstig mitzuwirken auf die Zusammensetzung des Sperma

Jedenfalls ist die Ansicht der meisten praktischen Ärzte, welche die Epididymitis für eine unangenehme, aber im allgemeinen wenig bedeutende Complication des Trippers ansehen, eine vorwiegend zu sanguinische.

Nachdem wir bisher den Weg der Entzündung von der Urethra bis zur Epididymis verfolgt haben, ist in der Aetiologie der Epididymitis noch das Trauma zu berücksichtigen. Denn dasselbe hat nach allen Beobachtungen grossen Einfluss auf das Zustandekommen der Nebenhodenentzündung, und dieser Umstand dient auch zur Stütze für unsere Ansicht, die Epididymitis entsteht durch Überwanderung des Gonococcus längs des Vas deferens bis zur Epididymis. Man kann sehr gut annehmen, dass durch heftige Körperbewegungen, wie schweres Arbeiten, viel Laufen, Reiten, Tanzen das Trippersekret auf der Schleimhautfläche der Harnröhre nach hinten geschoben wird und durch die fortwährende Erschütterung der Geschlechtsteile ein Eindringen in die Mündungen der Ductus eiaculatorii begünstigt wird. Daher ist auch Epididymitis als Complication der Gonorrhoe bei den unteren arbeitenden Volksklassen sehr viel häufiger als bei den begüterten, die sich schonen dürfen. Wenn Bergh das Verhältnis bei Hospitalpatienten 1:3 Gonorrhoeen, in seiner Privatpraxis 1:1 findet, so ist wohl nur ein Teil der Differenz dadurch erklärlich, dass aus den ärmeren Klassen bei weitem nicht alle Gonorrhoeen, wohl aber alle Epididymitis-Fälle zur ärztlichen, namentlich Hospitalbehandlung kommen; der andere Teil fällt dem Unterschied in der socialen Stellung direct zur Last, die verschiedene Beschäftigung bildet einen Hauptfactor für das häufige Eintreten der Epididymitis bei der körperlich arbeitenden Bevölkerung.

Noch klarer ist die traumatische Veranlassung, wenn sich aus dem Einführen von Kathetern oder Bougies fast unmittelbar Epididymitis anschliesst. In diesen Fällen muss das Virus durch das Instrument direct in den Ductus eiaculatorius eingepress worden sein, und der Vorgang ist ähnlich der Entwicklung von Cystitis durch Einführen von Kathetern. Prof. Neisser beobachtete 2 Fälle, wo sich direct an die Bougierung heftige Nebenhodenentzündung anschloss, und unter den Krankengeschichten der hiesigen Klinik ist ein Fall erwähnt, wo sich bei häufigem Katheterisiren wegen Cystitis Epididymitis entwickelte.

Hoden, welche durch abnorme Verhältnisse Traumen mehr

ausgesetzt sind als normale, sind auch zu Entzündung besonders disponiert. Ledouble³⁴⁾ fand in 14 Fällen von Epididymitis bei Hernia inguinalis zwölfmal die Entzündung auf der Seite der Hernie; in 9 Fällen von Varicocele achtmal. Auch waren die Entzündungen in diesen Fällen immer sehr schwer und zu Recidiven geneigt. Er fand auch mehrere Fälle von Epididymitis bei Cryptorchismus, wobei sich peritonitische Reizungen öfter als gewöhnlich zeigten, zuweilen auch wahre Peritonitis. Die Diagnose ist in derartigen Fällen sehr schwierig, und Ricord⁵⁾ hätte einmal beinahe in den Hoden geschnitten, in der Meinung, einen Abscess vor sich zu haben. Tarnowski⁵⁾ hat mehrere derartige Fälle zusammengestellt von Entzündung des Nebenhodens im Leistenkanal: Bauchard sah 6 Fälle, Robert 3, Galligo 6; auch Rollet beobachtete mehrere Fälle. Auch Inversio testiculari disponiert zu Epididymitis.

Es zeigt also sowohl Statistik als gewöhnliche klinische Erfahrung sowie die Beobachtung an den zuletzt erwähnten seltenen Ausnahmefällen, dass dem Trauma eine grosse Bedeutung bei der Entwicklung der Epididymitis zukommt. Diese Erfahrung ist therapeutisch dahin zu benützen, dass man für möglichste Vermeidung der Körperbewegung während der Gonorrhoe sorgt, oder wenigstens, wenn dieses, wie so oft, nicht durchzusetzen ist, dem Patienten ein Suspensorium giebt, um wenigstens die Bewegungen der Genitalien zu verhindern.

Es tritt nun die Frage an uns, ob mit der Annahme, dass die Epididymitis durch direkte Überwanderung der Gonococcen erfolgt, auch bestimmte Anhaltspunkte für die Therapie gewonnen sind. Wir würden unbedingte Prophylaxe der Epididymitis besitzen, wenn wir im Stande wären, die Virulenz der Gonorrhoe sogleich bei ihrem Beginn radikal zu beseitigen, die Coccen zu vernichten, ehe sie in die tieferen Teile der Urethra sich verbreitet haben. Leider haben wir das bis jetzt noch mit keiner Behandlungsweise erreichen können, und wir können auch kaum hoffen, durch Application der Medicamente auf die Harnröhrenschleimhaut eine sofortige Beseitigung der Gonococcen zu erreichen. Denn wie wir früher sahen, sitzen die Coccen nicht nur auf der Oberfläche der Epithelien, sondern auch zwischen denselben, und ein Mittel, welches sie hier erreichen und töten sollte, würde zugleich die Epitheldecke der Harnröhre in schwerer Weise

schädigen. Man hat die verschiedensten Desinficientien geprüft und nach allen Methoden angewendet, ohne eine schnelle und zugleich absolut sichere Heilung der Gonorrhoe zu erreichen. Namentlich in der Breslauer Klinik sind eingehende Untersuchungen gemacht und die Einwirkung der Medicamente auf den Coccenbefund genau durch häufige mikroskopische Prüfung verfolgt worden.

Zunächst wendete man das im Allgemeinen wirksamste Desinficiens, das Sublimat an. Es stehen mir 43 Krankengeschichten mit Sublimatbehandlung zur Verfügung; von diesen Patienten sind 22 mit Injectionen behandelt worden, 21 mit Ausspülungen, mit Lösungen von 1:15000.

Von den 22 mit Injectionen behandelten (0,01:300,0) sind 2 Heilungen erfolgt in 8 und 9 Tagen, das heisst der Ausfluss verschwand ganz. In 12 Fällen wurde der Ausfluss wässrig, ohne aber ganz zu verschwinden; die Patienten mussten, aus der Klinik entlassen, noch poliklinisch weiter behandelt werden. Meist waren im Ausfluss noch Coccen vorhanden, wenn auch nur einzeln oder in kleineren Haufen nicht sehr zahlreich. Die Behandlungszeit hatte eine bis mehrere Wochen gedauert.

In 8 Fällen war nach einer Behandlung von 4—16 Tagen keine wesentliche Besserung eingetreten, weder im Ausfluss noch wo dieser angegeben war, im Coccenbefund. Unter den 21 mit Spülungen behandelten Patienten sind 6 Heilungen erfolgt, der Ausfluss ist geschwunden. Von diesen wurde 1 Patient 7, einer 6, einer $2\frac{1}{2}$, zwei 2 Wochen, einer 10 Tage behandelt. Der Ausfluss blieb während der Beobachtung von einigen Tagen fort. In den übrigen 15 Fällen wurde in längerer Zeit von meist 10 Tagen bis zu einigen Wochen nur eine Besserung erreicht, indem das Sekret allmählich dünn und wässrig wurde und sich verringerte, ohne aber vollständig zu verschwinden. Auch blieben in vielen Fällen noch die Coccen nachweisbar.

Es tritt also bei Sublimatbehandlung nur in der Minderzahl der Fälle Heilung in einiger Zeit ein. In keinem Fall zeigte sich augenblickliches Verschwinden der Coccen; wenn sich ihre Zahl auch meist erheblich verringerte, so liessen sich kleinere Haufen oder einzelne Coccen immer noch sehr lange Zeit nachweisen oder traten wieder zahlreich auf, wenn die Behandlung einige Tage unterbrochen wurde. In wenigen Fällen waren sie nach längerer

Sublimatbehandlung noch in grossen Haufen zu finden. Der Ausfluss verringerte sich meist in einiger Zeit und verlor sein eitriges Aussehen, wurde wässrig oder schleimig; doch wechselten sich in dieser Beziehung die Erscheinungen sehr häufig, und bei Unterbrechung, zuweilen auch während der Sublimatbehandlung selbst trat wieder für einige Zeit dicker, gelber Ausfluss ein. Erfolgte Heilung, so dauerte es immerhin sehr lange, bis während der Ausfluss fortblieb, nachdem vorher die Coccen verschwunden waren.

Als Beispiele der Sublimatwirkung dienen folgende Krankengeschichten:

- 1) 29./9. 3mal tgl. Sublimatinjection 0,01:300; Ausspülung mit derselben Lösung.
 - 5./10. Sekret dünn, mit Coccen.
 - 8./10. Reichliches Sekret mit Coccen.
 - 13./10. Schleimig-eitriger Ausfluss.
- 2) 30./1. Reichlicher Gehalt an Coccen. 3mal tgl. Spülung mit Sublimat 1:10000.
 - 1./2. Mässige Coccen in dem dünnen, weisslichen Sekret.
 - 3./2. Ziemlich viel Coccen. Sublimat 1:5000.
 - 6./2. Sehr viel Coccen, Sekret reich, gelb.
 - 11./2. Geringe Zahl.
 - 14./2. Ganz vereinzelt; 2mal tgl. 1:15000.
 - 17./2. Kein Ausfluss.
 - 22./2. Spärlich Coccen.
 - 24./2. Ziemlich reichliche Coccen.
 - 28./2. Kein Ausfluss.
 - 2./3. Wenig Coccen in kleinen und grösseren Haufen.
- 7.—16./3. Keine Coccen.
 - 17./3. Seit einigen Tagen kein Ausfluss.
- 3) Im December 1883 inficiert, mit Sublimat und Wismuth bisher behandelt.
 - 15./2. Mässige Menge Coccen. 2mal tgl. Subl. 1:15000, Ausspülung.
 - 17./2. Ziemlich reichlich Coccen in Haufen.
 - 22./2. Mässige Coccenmenge. Täglich 1 Kochsalz- und 1 Sublimatspülung.
 - 25./2. Wenig vereinzelte Coccen.
 - 27./2. Ganz vereinzelte Coccen, geringer Ausfluss.

29./2. Wenig wässriger Ausfluss.

3./3. Kein Ausfluss. Entlassen.

Das Sublimat bewährt also bei Gonorrhoe nicht seine hervorragende bacterientötende Wirksamkeit. Prof. Neisser fand auch, dass es nicht gelang, mit Sublimat in Verdünnung von 1:2000 Culturen von Diplococcen absolut zu töten. Wahrscheinlich tritt zu schnell Gerinnung in der Peripherie der Pilzanhäufungen ein und dadurch werden die in der Mitte gelegenen Bakterien vor dem Sublimat geschützt, welches die Gerinnungsschicht nicht durchdringen vermag. Diese Pilze waren zwar keine Gonococcen, aber diesen nah verwandt, und verwandte Bakterien haben gleich biologische Bedingungen, so dass man diese Untersuchungen auch für Gonococcen gelten lassen kann.

Die Sublimatbehandlung reizt auch bei dieser Verdünnung von 1:15000 noch stark die Harnröhre, seine Anwendung ist also sehr schmerzhaft und auch der oft reichliche wässrige Ausfluss weist auf starke Reizung der Schleimhaut hin. Sublimat ist also nicht das Mittel, welches die Anforderungen erfüllt, die an ein Medicament gegen Gonorrhoe gestellt werden: möglichst sichere Tötung der Gonococcen bei möglichst wenig Reizung der Urethra. Trotzdem ist die Sublimatbehandlung nicht ohne Wert, auch als Prophylacticum gegen Epididymitis. Die Urethra wird gereinigt, der virulente Eiter entfernt, die oberflächlichsten Schichten der Schleimhaut gut desinficiert und in den meisten Fällen die Sekretion in kürzerer Zeit bedeutend gemässigt. Wenn man annimmt, dass Epididymitis hauptsächlich durch die auf der Oberfläche der Schleimhaut der Urethra befindlichen Cocci erzeugt wird, was nach den früheren Ausführungen wahrscheinlich ist, so schafft demnach das Sublimat Verhältnisse, die für Vermeidung der Epididymitis günstig sind, wenn sie auch keine absolute Sicherheit geben.

Während sonst in der Breslauer Klinik und Poliklinik aus 5 Gonorrhoeen eine Epididymitis kam, haben wir unter 43 mit Sublimat behandelten 5 Epididymitis, also 9:1 ungefähr. Von diesen ist einer poliklinisch mit Injectionen 4 Wochen lang behandelt worden, wo nicht immer für sorgfältige Ausführung der in der Klinik gegebenen Vorschriften von Seiten der Patienten gesorgt wird. Von den übrigen sind 2 mit Ausspülungen 6 und 8 Tage lang in der Klinik behandelt worden; der Ausfluss war

ssrig und enthielt wenig Coccen; die beiden letzten mit Injectionen 2 Wochen in der Klinik, Sekret sehr spärlich, in einem Falle keine Coccen, im andern war der Coccenbefund nicht angegeben. Sublimat beschränkt demnach die Epididymitis in ihrer Häufigkeit, ohne sie aber ganz sicher abhalten zu können.

Das zweite Mittel, welches namentlich in letzter Zeit sehr vielfach in Anwendung gezogen wird, ist das Argentum nitricum. Es hat sich nach experimentellen und praktischen Erfahrungen als das beste Medicament erwiesen, es tötet die Coccen sicher und reizt die Schleimhaut am wenigsten, bei einer Verdünnung von 1:3000 bis 1:2000. Zuweilen irritiert es noch in dieser Mischung die Schleimhaut, macht das Sekret reichlicher und unregelmäßiger; in chronischen Fällen ist dieses öfter erwünscht, um es in der Tiefe zwischen den Epithelien liegenden Gonococcen an die Oberfläche zu bringen. Eine schnelle Beseitigung der Coccen lässt sich allerdings auch damit nicht erzielen, aber wenn das Mittel lange genug und sorgfältig angewendet wird, bis längere Zeit die Coccen aus dem Sekret verschwunden sind, so lässt sich mit Argentum nitricum schneller und sicherer Heilung erreichen als mit jedem andern Mittel. Man darf allerdings nicht zu schnell aufhören, sondern muss es, eventuell neben andern stringierenden Injectionen, wie Zincum sulfuricum, noch längere Zeit, nachdem keine Gonococcen mehr nachzuweisen waren, anwenden. Die Gonorrhoe wird durch Höllenstein nicht nur am schnellsten geheilt, sondern ihr ganzer Verlauf gestaltet sich viel milder. Das acute Stadium mit den grossen Schmerzen und dem starken Ausfluss geht schnell vorüber, das Sekret wird meist in kurzer Zeit dünner und spärlich, die heftigen Reizungserscheinungen des acuten Trippers verschwinden und das ganze Krankheitsbild wird milder, mehr das der chronischen Gonorrhoe. Auch treten nach den persönlichen Erfahrungen Herrn Prof. Neissers die Complicationen, Periurethritis, Cystitis, viel seltener oder fast gar nicht mehr bei der Behandlung mit Argentum nitricum auf. Nur in chronischen Tripperfällen, wo man annehmen muss, dass sich die Gonococcen besonders in der Tiefe festgesetzt haben, sind sie auch bei langer Behandlung mit Höllenstein nicht zum Verschwinden zu bringen, sondern treten immer wieder von Zeit zu Zeit auf; in einem solchen Fall sah Neisser in seiner Privatpraxis einmal Epididymitis auftreten; dieses war der einzige Fall

bei Höllensteinanwendung. So günstig sind allerdings die Resultate in der Klinik nicht. Es wurden 113 Fälle mit Argentum nitricum, teils Injectionen, teils Ausspülungen, behandelt. Über 34 derselben existieren keine Angaben über den Erfolg der Behandlung. 22 Fälle sind geheilt worden, Coccen und Sekret sind vollständig geschwunden und in längerer Zeit auch nicht wieder aufgetreten. Die Zeit der Behandlung erstreckt sich dabei von 10 Tagen bis über 11 Wochen, dauerte im Allgemeinen etwa 3 Wochen. Die Gonorrhoeen, welche binnen 2 Wochen zur Heilung kamen, waren meist schon längere Zeit vorher behandelt worden und hatten geringes Sekret. Als Beispiel:

Gonorrhoe seit 5 Wochen.

- 18./3. Mässige Anzahl einzelner Haufen Coccen; tgl. Spülung mit Arg. nitr. 1:3000.
- 19./3. Geringe Anzahl von Coccen, keine Haufen.
- 20./3. Ganz vereinzelte Coccen, sehr spärliches Sekret.
- 22./3. Keine Coccen.
- 26./3. Keine Coccen, seit 2 Tagen kein Sekret.

In 49 Fällen trat keine Heilung, doch Besserung ein; 26 waren nur einige Tage in Behandlung; 19 wurden längere Zeit, mehrere Wochen, in der Klinik behandelt, einige sogar einige Monate, ohne dass vollständige Heilung eintrat. Fast immer nahm die Zahl der Gonococcen in wenigen Tagen bedeutend ab, aber einzelne waren in diesen chronischen Fällen immer wieder zu finden und sie traten bei Unterbrechung der Therapie wieder in grösserer Zahl auf. Das Sekret wurde meist bald spärlicher und dünnflüssig, wässrig; als Beispiele dienen folgende Krankengeschichten:

1) Gonorrhoe seit 2. Oct. 84.

- 13. Oct. Reichliche Coccenhaufen. Arg. nitr. 0,1 : 3000
3mal tgl. injiziert;
bis 18. Oct. keine Änderung des Coccenbefundes.
- 20—23. Coccen weniger in Haufen.

2) Gonorrhoeische Infection am 1. Febr.

- 16. Febr. Coccen sehr zahlreich in Haufen. Arg. nitr.
1 : 1000, 2 Spülungen.
- 17. Ebenso. 3 Spülungen.
- 18. Coccen nicht mehr in Haufen, einzeln zerstreut; ebenso
am 19. und 20.
- 21. Coccen nur noch spärlich, Sekret gering;

bis 5. März, wo eine Spülung mit Arg. nitr. 1 : 1000, und 2 Spülungen mit Zinc. sulfur. 0,25 %. Coccenbefund derselbe.

6. März: Subl. 0,01 : 200, 3 Injectionen.

7. Coccen wieder reichlicher.

10. Coccen wieder in Haufen.

14. Ebenso. Arg. nitr. 1 : 1000, 2 Spülungen.

15. Ebenso. 3 Spülungen.

17. Ebenso.

18. Coccen bedeutend spärlicher.

19. Ebenso.

20. Coccen kaum noch deutlich sichtbar.

21. Sehr vereinzelt deutlich, an einer Stelle ein Häufchen.

23. Wieder etwas zahlreicher.

24. Nicht sichtbar.

25. Mehrere Haufen.

26.—28. Nicht zu finden.

Ungeheilt, unverändert in Bezug auf Coccen und Sekret, blieben Fälle; 5 davon wurden nur 3 Tage behandelt, 3 zwei Wochen.

Wir haben also bei der Behandlung mit Argentum nitricum Bezug auf Besserung und Heilung der Gonorrhoe noch günstigere Resultate als bei Anwendung von Sublimat, es werden mehr und schnellere Heilungen erzielt und die Zahl der erfolglos behandelten Fälle ist viel geringer, fast immer wird der gonorrhoeische Process schnell seines acuten Charakters beraubt, wenn auch nicht coupiert.

Epididymitis im Verlauf oder nach der Argentum nitricum-Behandlung ist sechsmal aufgetreten. In der Klinik behandelt wurden davon drei. Der eine bekam 5 Wochen nach der Aufnahme Epididymitis während er mit Arg. nitricum injizierte. Bis 8 Tage vor der Erkrankung an Epididymitis hatte er die Injectionen eine Woche lang ausgesetzt, der Tripper hatte sich zu dieser Zeit sehr verschlimmert.

Der zweite Patient erkrankte an Epididymitis eine Woche, nachdem er die Klinik als „geheilt“ verlassen hatte, da kein Sekret mehr aufgetreten war. Offenbar war die Behandlung zu zeitig abgebrochen worden und die Heilung nur eine scheinbare gewesen, denn zugleich mit der Epididymitis trat neuer, eitriger Ausfluss mit Coccen auf.

Der dritte Patient war längere Zeit mit Ausspülungen behan-

delt worden; als zuletzt nur noch einzelne Coccen vorhanden waren, musste die Ausspülung unterbrochen werden, da plötzlich hohes Fieber auftrat. 4 Tage nach der Unterbrechung war die Coccen wieder zahlreicher, in vereinzelter Haufen, und trat Epididymitis ein.

Poliklinisch waren ebenfalls 3 Patienten mit Gonorrhoe-Epididymitis erkrankt.

Der erste war 14 Tage mit Injectionen, 0,1:300, behandelt worden, als er Epididymitis bekam.

Der zweite war 6 Wochen wegen Gonorrhoe behandelt worden, zuletzt waren keine Coccen mehr nachgewiesen worden, aber blieb goutte militaire; 2 Wochen später erkrankte er an Nebenhodenentzündung. Auch hier hatte trotz der langen Behandlung das gonorrhoeische Virus nicht vernichtet werden können, die Therapie ist zu zeitig aufgegeben worden. Dasselbe ist bei dem 3. Fall zu bemerken. Nach 14 tägiger Behandlung des Trippers mit Arg. nitr. 0,1:200 waren Coccen und Sekret geschwunden, der Patient als geheilt entlassen, 10 Tage später bekam er Epididymitis, zugleich zeigte sich wieder gelbes eitriges Sekret mit sehr zahlreichen Coccen.

Einwurfsfrei von den 6 Epididymitisfällen bei Argentum-Bebehandlung sind demnach höchstens zwei, einer aus der Klinik, einer aus der Poliklinik, wo man nicht einmal bestimmt weiss, ob die Injectionen richtig ausgeführt worden.

In den andern 4 Fällen ist die Behandlung offenbar zu einer Zeit abgebrochen worden, wo der Harnröhrenkatarrh noch nicht seine Virulenz verloren hatte; es trat wieder Sekret mit Coccen auf zugleich mit der Epididymitis. Diese Fälle lehren nur, dass man mit der Höllensteinbehandlung nicht eher aufhören darf, bis man sich durch wiederholte, an mehreren Tagen angestellte, sorgfältige Untersuchungen von der definitiven Abwesenheit der Gonococcen überzeugt hat.

Es kommen also unter 79 genauer beobachteten, mit Argentum-nitricum behandelten Gonorrhoe-Fällen 2 Epididymitis-Fälle vor, die sich während der Behandlung selbst zeigten. Von den 34 Patienten, denen Arg. nitr. verordnet wurde, die aber nicht längere Zeit beobachtet wurden, ist keiner mit Epididymitis wiedergekommen. Der prophylaktische Erfolg ist demnach sehr günstig und vielleicht besser noch als bei Sublimatbehandlung.

Über Wirkung von Zincum sulfuricum, Borsäure, Chromsäure, Natrium subnitricum, Kali chloricum liegen nur vereinzelte Beobachtungen vor, aus denen sich bestimmte Schlüsse nicht ziehen lassen. Immer aber bemerkt man bei regelmässiger Anwendung aller dieser Mittel eine erhebliche Verminderung der Gonococcen, die gewöhnlich nur noch zerstreut und in kleineren Mengen aufzutreten pflegen; sowie aber das Medicament einige Zeit ausgesetzt wird, treten die Gonococcen wieder zahlreich auf.

Das beste Mittel neben Argentum nitricum ist noch Natrium salicylicum in 5% Lösung; es irritiert sehr wenig und wirkt sowohl auf die Verminderung des Ausflusses wie auf den Gonococcen-Erhalt sehr günstig ein. Wie weit das Natrium salicylicum auf die Verhütung der Epididymitis einwirkt, lässt sich aus der geringen Zahl der vorliegenden Fälle nicht ersehen; unter diesen Fällen tritt keine Nebenhodenentzündung auf.

Die Schlussfolgerungen, welche aus der Theorie von der Wanderung der Gonococcen für die Behandlung von Gonorrhoe und Epididymitis gezogen wurden, werden durch die Erfolge der antiparasitären Behandlung gerechtfertigt, soweit es sich hoffen lässt. Wenn die Vermeidung der Epididymitis bei Anwendung von Sublimat und Argentum nitricum nicht absolut sicher ist, so liegt das in der Beschaffenheit der Harnröhre und dem Sitz des Gonococcus begründet; während einer längeren Dauer der Gonorrhoe kann durch irgend eine Veranlassung traumatischer Natur hin und wieder auch während der Höllensteinbehandlung einmal Epididymitis auftreten. Doch werden solche Fälle bei sorgfältiger und vorsichtiger Anwendung des Medicaments immer selten sein. Jedenfalls ist diese Methode die beste, welche wir gegenwärtig haben, sowohl für die Therapie des Trippers als auch für die Prophylaxis der Epididymitis.

Résumé.

In der vorliegenden Arbeit ist auf einige Gebiete der Epididymitis, auf pathologische Anatomie, anatomische und physiologische Verhältnisse und auf die Pathogenese eingegangen und auf letzterer die Theorie einer prophylactischen Behandlung begründet worden. Das Häufigkeitsverhältnis zwischen Gonorrhoe und Epididymitis schwankt aus verschiedenen Gründen zwischen Hospital-

praxis und Privatpraxis; die Extreme der Angaben sind $\frac{1}{3}$ und in hiesiger Klinik $\frac{1}{5}$. Die Theorien von Diday mit ihrem Einfluss auf die Therapie, und von Desprès werden eingehend besprochen und widerlegt; darauf wird der Gonococcus in Aussehen, mit Berücksichtigung der Färbemethoden, sein Verhalten im gonorrhoeischen Sekret geschildert, und die Beweise, dass er das Virus der Gonorrhoe sei, erbracht. Sein Sitz wird im und auf dem Epithel der Urethra gefunden. Auf seinen Befund stützt sich die Theorie von der Überwanderung der Entzündung durch das Vas deferens zur Epididymis. Es wird angenommen, dass die Entzündung, hauptsächlich die auf der Oberfläche der Schleimhaut gelegenen, bis zum Ductus ejaculatorius und dann zur Epididymis kommen. Dies wird begründet: 1. durch die anatomischen Verhältnisse und das klinische Verhalten der Gonorrhoe; 2. durch die Zeit des Auftretens der Epididymitis nach der Gonorrhoe. Nie gleich zu Anfang, selten am Ende der ersten Woche, meist in der 3. bis 4. Woche; 3. Verfolgen der Entzündung auf ihren Wegen klinisch sowohl wie anatomisch: a. Beteiligung der Prostata: Sehr häufig erkrankt der der Epididymitis gleichseitige Lappen; kann zum Verschluss der Ductus ejaculatorii führen. b. Spermatocystitis. Die Häufigkeit derselben ist nicht bestimmbar, braucht aus anatomischen Gründen nicht immer beteiligt zu sein. 1. werden subjective und objective Symptome und Anatomie besprochen; Folgeerscheinungen: Heilung, Abscess, Cystenbildung, Steinbildung. c. Funiculitis und Deferentitis: Die Häufigkeit des klinischen Auftretens wird wechselnd angegeben, nach manchen Autoren fast alle, meist über die Hälfte der Fälle von Epididymitis sind damit compliciert. Symptome, Verlauf und Anatomie werden besprochen. Es ist eine catarrhalische Entzündung des Vas deferens und Infiltration seiner Hüllen, kann zu Narbenbildung und Obliteration führen. d. Epididymitis: Die klinischen Erscheinungen sind wechselnd, zuweilen sehr schwer; Verlauf über 3 bis 4 Wochen. Folgezustände experimentell an Hunden studiert bei Menschen in Catarrh und Infiltration des Gewebes, spätere Schrumpfung und Narbenbildung mit Schädigung von Epithelium und Muscularis bestehend. Klinisch zeigen sie sich in Narbenknoten und Azoospermie: findet sich unter 88 Fällen von Epididymitis duplex 75mal. Häufigkeit der Epididymitis schwankt zwischen $\frac{1}{12}$ und $\frac{1}{28}$ aller Epididymitis-Fälle. 4. Der Einfluss

Trauma: Allgemein die sociale Stellung; local durch ein-
gebrachte Instrumente und durch Abnormitäten: Hernia inguinalis,
Hydrocoele, Kryptorchismus. Als Prophylacticum hingegen wird
das Suspensorium empfohlen.

Einfluss der Theorie auf die Behandlung von Gonorrhoe.
Die Behandlung der Sublimatbehandlung zeigt diese nicht vollkommen
unfähig gegen Gonorrhoe und Epididymitis. Unter 43 Fälle
kommen 5 Nebenhodenentzündungen. Das Argentum nitricum
wirkt sich gegen beide Krankheiten wirksamer: 6 Epididymitis
unter 79 Fällen von Gonorrhoe; unter diesen 6 sind nur 2 Fälle
verurtheilt. Kurz werden noch die andern Mittel gegen Gonor-
rhoe erwähnt.

Am Schluss meiner Arbeit erfülle ich sehr gern meine Pflicht,
dem Prof. Dr. Neisser für die Anregung zu derselben und
die gütige Überweisung des Materials meinen herzlichen Dank
sagen.

Litteratur-Verzeichnis.

- 1) Citirt nach Fürbringer: Die Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. Braunschweig 1884.
- 2) Bericht des k. k. Krankenhauses Wieden.
- 3) Ärztlicher Bericht des k. k. allgemeinen Krankenhauses zu Wien.
- 4) Chirurgische Wochenschrift 1884, No. 10.
- 5) Tarnowski: Vorträge über venerische Krankheiten. Berlin 1882.
- 6) Bergh: Über funiculitis gonorrhoealis. Vierteljahrsschrift für Dermatologie und Syphilis 1882, p. 146.
- 7) Ernest Besnier: Étude sur le rhumatisme blennorrhagique, Annales de dermatologie et de syphiligraphie 1876/77.
- 8) Horteloup et Jullien: Note sur la blennorrhagie et les déviations du processus blennorrhagique; Annales de dermat. 1883.
- 9) Société de chirurgie, séance du 15. Febr. 1881. Progrès médical 1881, p. 10.
- 10) Guellevier: Précis iconographique des maladies vénériennes. Paris 1881.
- 11) Malassez et Terrillon: Anatomie pathologique de l'épididymite et de son rôle dans l'inflammation du canal déférent. Archiv de physiologie. 1881.
- 12) Dr. Bumm: Der Microorganismus der gonorrhoeischen Schleimhauterkrankungen. Wiesbaden 1885.
- 13) Nouveau dictionnaire de méd. et de chirurgie, Artikel blennorrhoe, p. 10.
- 14) Jullien: Maladies vénériennes. Paris 1866.
- 15) Neumann, Über Complicationen der Urethritis. Allgem. Wiener medicinische Zeitschrift. 1884.
- 16) Dr. Róna: Die blennorrhoeische Entzündung der samenbereitenden und ausführenden Organe. Pesther medicinisch-chirurgische Presse 1885, No. 10.
- 17) Rapin: De l'inflammation des vésicules séminales et des canaux éjaculateurs. Thèse. Strassbourg 1859.
- 18) Journal de médecine et de chirurgie. 1874.
- 19) Liégeois: Influence des maladies du testicule et de l'épididyme sur la composition du sperme. Annales de dermat. 1869, p. 410.
- 20) Gazette des hôpitaux 1854, p. 59.
- 21) Archives générales de médecine, t. XXVII., 1^{re} série, 1831.
- 22) Vierteljahrsschrift für Dermatologie 1869, p. 259.
- 23) Dr. Martin: Recherches sur les inflammations à la suite de la gonorrhée. Genf 1882, p. 12.
- 24) Pitha-Billroth: Lehrbuch der Chirurgie, Abt. Hodenkrankheiten.
- 25) Dr. Englisch: Über Cysten der hinteren Blasenwand, Wiener medicinische Jahrbücher 1874, p. 127.
- 26) Virchows Archiv. Bd. 15.
- 27) Vierteljahrsschrift für Dermatologie 1869, p. 605.
- 28) Vierteljahrsschrift für Dermatologie 1871, p. 58.
- 29) Annales de dermatologie 1870—71, p. 311.
- 30) Vierteljahrsschrift für Dermatologie 1871, p. 411.
- 31) Terrillon: Des altérations du sperme dans l'épididymite blennorrhagique. Annales de dermatologie 1880, p. 439.
- 32) Zeissl: Über die Entzündung des Vas deferens und Nebenhoden. Wiener med. Zeitg. 1870, p. 48.
- 33) Vierteljahrsschrift für Dermatologie 1879, p. 575.
- 34) Ledouble: Fréquence de l'épididymite dans le cas de hernia inguinale, de varicocèle, ou d'anomalies de l'appareil génital. Annales de dermatologie 1880, p. 130.

Lebenslauf.

Reinhold Kreckler, bin geboren am 8. August 1862 als Sohn des Bauerngutsbesitzers Gottfried Kreckler zu Baumgarten, Kreis Ohlau, und gehöre der evangelischen Confession an. Von September 1870 bis 2. August 1881 besuchte ich das Gymnasium Ohlau und erhielt daselbst das Zeugnis der Reife. Ich studierte Medicin an der Universität Breslau und bestand daselbst am 18. Juli 1883 das Tentamen physicum und am 16. Juli 1885 das Examen rigorosum. Im Winter-Semester 1885/86 legte ich die medicinische Staatsprüfung in Breslau ab und schloss dieselbe am 9. März 1886 ab.

Während meiner Studien besuchte ich die Vorlesungen und Vorlesungen folgender Herren Professoren und Docenten:

Berger, Biermer, Born, F. Cohn, H. Cohn, Fischer, Förster, Fränkel, Fritsch, Gottstein, Gscheidlen, Haeser, Hasse, Heidenhain, Hirt, Kroner, Löwig, Meyer, Neisser, Partsch, Ponfick, Richter, Rosenbach, Roux, Soltmann Unverricht.

Allen diesen meinen hochverehrten Lehrern spreche ich hiermit meine aufrichtige Dankbarkeit aus.

Thesen.

I.

Der Lupus ist eine tuberculöse Hautaffektion.

II.

Die Quecksilberbehandlung der Syphilis hat nicht nur eine curative, sondern auch eine präventive Wirkung.

III.

Das Vorhandensein rein trophischer Nervenfasern ist nicht wiesen.

IV.

Die Auskratzung ist die sicherste und schnellste Art der Behandlung des Abortus.
